herpy

FRØER

Oriental Fire-bellied Toad

Bombina orientalis

Bombina orientalis er en robust, halvt vandlevende frø på 4-6 cm med grøn, vortet ryg og en knaldrød, sortplettet bug, som den viser frem, når den føler sig truet. Den er aktiv om dagen, tåler stuetemperatur, tager villigt almindelige foderinsekter og kan leve i mange år. Derfor er den en af de bedste arter at begynde med, hvis du vil holde frøer.

Familie: Bombinatoridae Tidligere navn: *Bombinator orientalis* Udgivet 15. november 2026 **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**4-6 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-20 år**
Aktiv	**Dag og skumring**
Levevis	**Semi-akvatisk**
Biotop	**Vådområde og tempereret skov og eng**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Begynder**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 30 × 40 cm** L × B × H til 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-28 °C**
Temperatur, nat	**16-20 °C**
Luftfugtighed	**50-80 %**
Vand	**Akvaterrarie** dybde 5-10 cm
Vandtemperatur	**18-22 °C**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Vinterhvile	**3-8 °C** 8-12 uger
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**I vand**
Kønsmoden	**12-18 mdr.**
Æg pr. lægning	**2-150**
Lægninger pr. år	**2-8**
Klækning	**3-10 dage** ved 15-25 °C
Larvetid	**30-90 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Ikke opført på CITES ifølge opslagstabellen, så der kræves ingen CITES-papirer. EU-bilaget er ikke aflæst for frøer og er derfor udeladt. Sæt aldrig dyr ud: arten kan krydse sig med de europæiske arter af slægten Bombina og kan bære chytridsvampe.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Bombina orientalis tilbringer meget af tiden i vandet, så den skal have et akvaterrarie, hvor omkring to tredjedele af bundfladen er vand og en tredjedel land.

TEMPERATUR
Arten klarer sig fint ved stuetemperatur. Om dagen er 22-28 °C passende, og om natten må det gerne falde til 16-20 °C. Det er godt med forskel i terrariet: varmest under lyset, køligere i skjulene.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING
Luftfugtigheden skal ligge på 50-80 %. Den store vanddel gør det meste af arbejdet, så det er sjældent nødvendigt at sprøjte mere end let en gang om dagen på landdelen, især i en tør stue om vinteren.

VAND OG VANDKVALITET
Vandet skal være 5-10 cm dybt, og dyrene skal altid let kunne komme op, fx ad en skrå rod, flade sten eller planter. *B. orientalis* svømmer sjældent under vandet, men ligger gerne i overfladen.

LYS OG UVB
Giv 12-14 timers lys om sommeren og lidt kortere dage forår og efterår, styret af et tænd-sluk-ur. En LED-armatur eller et lysstofrør giver grundlyset, og en svag spot over landdelen kan give en lun soleplads. UVB anbefales.

FODER
B. orientalis kan ikke skyde tungen ud, men fanger byttet med et hop på et par cm og propper større bytte ind med forbenene. Foderet skal bevæge sig, og døde dyr bliver normalt ikke taget.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Arten er nysgerrig og aktiv det meste af dagen og ses ofte åbent fremme på land eller i vandet. *B. orientalis* er selskabelig og kan holdes i par eller grupper, og kønnene kan gå sammen hele året.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Kina, Nordkorea, Sydkorea og Rusland.