herpy

FRØER

Gulbuget klokkefrø

Bombina variegata

Bombina variegata er en lille, kompakt frø på 3-6 cm med grå-brun, spidsvortet ryg og en skarpt gul og blågrå bug, som den viser frem, når den føler sig truet. Arten lever i bjerg- og bakkelandet i Mellem- og Sydeuropa, holder af små, solvarme vandhuller og er hårdfør, nysgerrig og langlivet i terrariet. Den kræver kølige temperaturer og en kølig vinterhvile, men ellers kun lidt plads.

Familie: Bombinatoridae Engelsk: Yellow-bellied Toad **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**3-6 cm** snude-kloak-længde
Vægt	**2,3-12 g**
Levetid	**10-20 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Semi-akvatisk**
Biotop	**Vådområde og tempereret skov og eng**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Begynder**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 30 × 30 cm** L × B × H til 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Temperatur, nat	**16-20 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Vanddel** dybde 5-10 cm
UVB	**Valgfri**
Vinterhvile	**5-10 °C** 8-12 uger
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**I vand**
Kønsmoden	**12-24 mdr.**
Æg pr. lægning	**40-170**
Lægninger pr. år	**1-3**
Klækning	**2-3 dage**
Larvetid	**25-70 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Ikke opført på CITES ifølge opslagstabellen, så der kræves ingen CITES-papirer. EU-bilaget er ikke aflæst for frøer og er derfor udeladt. Arten står på bilag II og IV i EU's habitatdirektiv. Efter artsfredningsbekendtgørelsen (BEK nr. 521/2021, § 11) må dyr indsamlet i naturen derfor ikke holdes, handles, overdrages eller udstilles i Danmark. Opdrættet afkom af lovligt erhvervede dyr er undtaget (§ 2), men ejeren skal kunne godtgøre, at dyret ikke stammer fra naturen (§ 20). Sæt aldrig dyr ud: arten kan krydse sig med *Bombina bombina* og kan bære chytridsvampe.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Der findes ikke mange detaljerede pasningsbeskrivelser af *Bombina variegata*. Anbefalingerne her bygger på artens levevis og på den nære slægtning *Bombina orientalis*, som er langt bedre kendt i fangenskab.

TEMPERATUR
Arten er tilpasset et tempereret klima og skal ikke have varme som de fleste terrariedyr. Om dagen er 20-24 °C passende, og om natten skal det være lidt køligere, 16-20 °C.

LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING
Luftfugtigheden skal ligge på 60-80 %. Den store vanddel holder det meste af fugten, så det er normalt nok at forstøve landdelen let en gang om dagen, især i en tør stue om vinteren.

VAND OG VANDKVALITET
Vanddelen skal fylde omkring halvdelen af bundfladen og være 5-10 cm dyb. Dyrene ligger gerne i overfladen eller på flydende planter og skal let kunne komme op på land, fx ad skrå rødder, flade sten eller planter.

LYS OG UVB
Giv 12-14 timers lys om sommeren og ned til omkring 10 timer om vinteren, styret af et tænd-sluk-ur. En LED-armatur giver grundlyset og får planterne til at trives. Der er ikke brug for en varmelampe. UVB er valgfrit.

FODER
B. variegata har stor appetit og tager alt levende, der er lille nok til at passe i munden: fårekyllinger, sirisser, bananfluer, fluer, bænkebidere, sølvfisk, små regnorme og små snegle.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
B. variegata er nysgerrig og selskabelig og kan holdes i par eller i grupper. Dyrene bør være omtrent lige store, fordi store dyr kan æde små, og ved fodring kan de blive lidt pågående.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Frankrig, Belgien, Nederlandene, Luxembourg, Tyskland, Schweiz, Liechtenstein, Østrig, Italien, Tjekkiet, Slovakiet, Polen, Ungarn, Rumænien, Moldova, Ukraine, Slovenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro, Nordmakedonien, Albanien, Bulgarien og Grækenland.