herpy

FRØER

Brazilian Horned Frog

Ceratophrys aurita

Ceratophrys aurita er slægtens største art: en bred, nedgravet bagholdsjæger, der kun findes i Brasiliens atlantiske regnskov. Arten er sjælden i naturen og lidt kendt i terrarier, så pasningen bygger på de nærmeste slægtninge. Den skal bo alene, æder næsten alt, der passer ind i munden, og bider hårdt.

Familie: Ceratophryidae Tidligere navn: *Ceratophrys dorsata; Ceratophrys varia*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**15-23 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**6-15 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Regnskov og vådområde**
Hudgift	**Ingen kendt**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 45 × 30 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Temperatur, nat	**22-24 °C**
Luftfugtighed	**65-80 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**I vand**
Æg pr. lægning	**900-2.000**
Klækning	**2-4 dage** ved 24-26 °C
Larvetid	**21-41 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Andre haletudser**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står ikke på CITES-listerne, så der kræves ingen CITES-papirer. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og angives derfor ikke her. Køb opdrættede dyr, og bed om dokumentation for oprindelsen.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Ceratophrys aurita*.
TEMPERATUR	Om dagen holdes terrariet på 24-28 °C og om natten på 22-24 °C. Brug en varmemåtte på siden af terrariet eller et varmekabel, aldrig en lampe, der tørrer luften. Brug altid termostat, og mål temperaturen nede ved bunden.
LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING	Luftfugtigheden holdes på 65-80 %, i den fugtige ende af det, slægtens almindelige arter får, fordi levestedet er regnskov.
VAND OG VANDKVALITET	Giv altid frisk vand i en lav, tung skål, som frøen ikke kan vælte, og som er stor nok til, at hele dyret kan ligge i den. Vandet må højst nå frøen til munden, så den kan hvile med hovedet over vandet.
LYS OG UVB	UVB er ikke nødvendigt for *Ceratophrys aurita*, men et svagt UVB-rør (Ferguson-zone 1) kan være en fordel, når der er rigeligt skygge og mulighed for at grave sig ned. Almindelig LED-belysning i 12 timer giver en fast døgnrytme.
FODER	*Ceratophrys aurita* æder næsten alt, der bevæger sig og kan komme ind i munden; i naturen også andre frøer, firben, slanger, fugle og gnavere.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er rolig og stillesiddende og kan ligge på samme sted i uger. Den lokker bytte til ved at bevæge fødderne i jorden, så det ligner orme, der kryber.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Brasilien.