herpy

FRØER

Venezuelan Horned Frog

Ceratophrys calcarata

Ceratophrys calcarata er en bred, nataktiv bagholdsjæger fra de tørre lavlande i Colombia og Venezuela. Den ligger nedgravet med kun øjne og mund fremme og snupper alt, der passer ind i munden. Arten bliver 6-8 cm, skal bo alene og passes som slægtens bedre kendte arter. Den bider hårdt.

Familie: Ceratophryidae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**6-8 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Savanne og tørskov**
Hudgift	**Ingen kendt**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 30 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Temperatur, nat	**22-24 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**I vand**
Kønsmoden	**18-24 mdr.**
Æg pr. lægning	**335**
Lægninger pr. år	**1**
Klækning	**2-4 dage** ved 24-26 °C
Larvetid	**14-30 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Andre haletudser**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Ikke opført på CITES ifølge opslagstabellen, så der kræves ingen CITES-papirer. EU-bilaget er ikke aflæst for frøer og er derfor udeladt.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Der findes kun lidt viden om pasningen af *Ceratophrys calcarata*. Klimaet i udbredelsesområdet er varmt, og levemåden svarer til *Ceratophrys cranwelli* og *Ceratophrys ornata*, som er langt bedre kendt i fangenskab.

TEMPERATUR
Om dagen holdes terrariet på 25-28 °C og om natten på 22-24 °C. Lavlandet er varmt hele året, så temperaturen skal ikke falde markant om vinteren.

LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING
Luftfugtigheden holdes på 60-80 %. Arten kommer fra tørre lavlande, men lever i regntiden under fugtige forhold, så bunden skal være fugtig hele året. Forstøv let om aftenen, så jorden holdes fugtig, men ikke våd.

VAND OG VANDKVALITET
Giv altid frisk vand i en lav, tung skål, som frøen ikke kan vælte, når den graver, og som er stor nok til, at hele dyret kan ligge i den. Vandet skal højst nå frøen til munden, så den kan hvile med hovedet over vandet.

LYS OG UVB
UVB er ikke nødvendigt for *Ceratophrys calcarata*, men frøen får lidt UV i naturen, og et svagt UVB-rør (Ferguson-zone 1) kan være en fordel. Giv i så fald rigeligt skygge med bredbladede planter og mulighed for at grave sig ned.

FODER
Ceratophrys calcarata æder næsten alt, der bevæger sig og kan komme ind i munden. I naturen æder voksne dyr mest andre frøer.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Ceratophrys calcarata er en rolig, stillesiddende frø, der kan ligge på samme sted i uger. Den er nataktiv.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Colombia og Venezuela.