herpy

FRØER

Amazonian Horned Frog

Ceratophrys cornuta

Ceratophrys cornuta er en kraftig, bredmundet frø fra regnskoven i Amazonas og Guyanaregionen, som ligger nedgravet i løvlaget med kun øjne og horn synlige og slår til, når noget spiseligt kommer forbi. Hunnerne bliver op til 15 cm, og munden kan tage bytte, der er næsten lige så stort som dem selv. Som regnskovsart skal den have mere fugt end slægtningene fra de tørre sletter længere mod syd.

Familie: Ceratophryidae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**7-15 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Regnskov og vådområde**
Hudgift	**Ingen kendt**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 45 × 30 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Temperatur, nat	**23-25 °C**
Luftfugtighed	**75-90 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**I vand**
Kønsmoden	**36-48 mdr.**
Æg pr. lægning	**300-1.000**
Klækning	**3-25 dage**
Larvetid	**28-90 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Andre haletudser**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Ikke opført på CITES ifølge opslagstabellen, så der kræves ingen CITES-papirer. EU-bilaget er ikke aflæst for frøer og er derfor udeladt.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes forholdsvis lidt viden om pasningen af *Ceratophrys cornuta*, fordi arten opdrættes langt sjældnere end *Ceratophrys cranwelli* og *Ceratophrys ornata*.
TEMPERATUR	Om dagen holdes terrariet på 25-28 °C og om natten på 23-25 °C. Tallene er lånt fra slægtens øvrige arter og ligger i den varme ende, fordi *C. cornuta* kommer fra varm regnskov.
LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING	Luftfugtigheden holdes på 75-90 % hele året, højere end for de beslægtede arter fra Pampas og Chaco, fordi arten kommer fra regnskov.
VAND OG VANDKVALITET	Giv altid en lav skål med frisk, behandlet vand, stor nok til at hele frøen kan ligge i den, men med vandstand højst op til frøens mund. Frøen svømmer dårligt og skal kunne hvile med hovedet over vandet og komme op uden besvær.
LYS OG UVB	UVB er ikke nødvendigt, men et svagt UVB-rør (Ferguson-zone 1) kan være til gavn. Hæng det over den ene side, så der altid er skygge i resten, og undlad UVB til albinodyr, som er lysfølsomme.
FODER	Arten æder næsten alt, der kan komme ind i munden. I naturen æder den frøer, fisk, firben, mus og andre hvirveldyr samt store insekter.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Ceratophrys cornuta* er en stillesiddende frø, der ligger nedgravet det meste af tiden og kun kommer frem for at æde. Fuldvoksne dyr er aggressive og kan springe efter en hånd, der kommer for tæt på, og bidet gør ondt.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Brasilien, Venezuela, Guyana, Surinam og Fransk Guyana.