herpy

FRØER

Chacoan Horned Frog

Ceratophrys cranwelli

Ceratophrys cranwelli er en bred, nataktiv bagholdsjæger fra Gran Chaco i Sydamerika. Den ligger nedgravet med kun øjne og mund fremme og snupper alt, der passer ind i munden. Arten bliver 8-13 cm, skal bo alene og er robust nok til at være en god første frø, hvis du kan leve med, at den ikke er til at tage op og bider hårdt.

Familie: Ceratophryidae Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**8-13 cm** snude-kloak-længde
Vægt	**117-202 g**
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Savanne og tørskov**
Hudgift	**Ingen kendt**
Sværhedsgrad	**Begynder**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 30 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Temperatur, nat	**22-24 °C**
Luftfugtighed	**50-70 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Vinterhvile	**16-20 °C** 6-12 uger
Kost	**Insekter, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Ægglægning	**I vand**
Kønsmoden	**18-24 mdr.**
Æg pr. lægning	**900-2.000**
Klækning	**2-4 dage** ved 24-26 °C
Larvetid	**21-41 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Andre haletudser**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Ikke opført på CITES ifølge opslagstabellen, så der kræves ingen CITES-papirer. EU-bilaget er ikke aflæst for frøer og er derfor udeladt.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et voksent dyr skal have et vandret terrarie på mindst 45 × 45 × 30 cm. Tommelfingerreglen er et gulvareal på 8-10 gange dyrets størrelse, og højden betyder mindre, for *Ceratophrys cranwelli* sidder på jorden og klatrer ikke.

TEMPERATUR
Om dagen holdes terrariet på 24-28 °C og om natten på 22-24 °C. Unge frøer æder dårligt, hvis det er meget under 25 °C.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING
Luftfugtigheden holdes på 50-70 %, lavere end til de fleste andre sydamerikanske frøer, fordi Gran Chaco er et tørt område. *C. cranwelli* tåler, at fugten falder i løbet af dagen, så længe bunden er fugtig.

VAND OG VANDKVALITET
Giv altid frisk vand i en lav, tung skål, som frøen ikke kan vælte, når den graver, og som er stor nok til, at hele dyret kan ligge i den. Vandet skal højst nå frøen til munden, så den kan hvile med hovedet over vandet.

LYS OG UVB
UVB er ikke nødvendigt for *Ceratophrys cranwelli*, men frøen får nok lidt UV i naturen, og et svagt UVB-rør (Ferguson-zone 1) kan være en fordel.

FODER
Ceratophrys cranwelli æder næsten alt, der bevæger sig og kan komme ind i munden. I naturen æder den bl.a. andre frøer.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Ceratophrys cranwelli er en rolig, stillesiddende frø, der kan ligge på samme sted i uger. Den er nataktiv og hviler med åbne øjne.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Argentina, Bolivia, Paraguay og Brasilien.