herpy

FRØER

Ornate Horned Frog

Ceratophrys ornata

Ceratophrys ornata er en kraftig, bredmundet frø fra Pampas i Argentina, Uruguay og det sydligste Brasilien, som ligger nedgravet og venter på, at noget spiseligt kommer forbi. Hunnerne bliver op til 17 cm og kan sluge bytte, der er næsten lige så stort som dem selv. Arten er robust og nem at passe, men kræver respekt for munden og fast rutine med rengøring og fodring.

Familie: Ceratophryidae Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**8-17 cm** snude-kloak-længde
Vægt	**187-482 g**
Levetid	**6-15 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Vådområde og tempereret skov og eng**
Hudgift	**Ingen kendt**
Sværhedsgrad	**Begynder**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 30 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Temperatur, nat	**22-24 °C**
Luftfugtighed	**65-80 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Vinterhvile	**16-20 °C** 6-12 uger
Kost	**Insekter, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**I vand**
Kønsmoden	**12-24 mdr.**
Æg pr. lægning	**1.000-2.000**
Klækning	**2-4 dage** ved 24-26 °C
Larvetid	**28-41 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Andre haletudser**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Ikke opført på CITES ifølge opslagstabellen, så der kræves ingen CITES-papirer. EU-bilaget er ikke aflæst for frøer og er derfor udeladt. Arten står som sårbar (VU) på IUCN's rødliste, så køb opdrættede dyr.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et voksent dyr skal have et vandret terrarie på mindst 45 × 45 × 30 cm. Tommelfingerreglen for slægten er et gulvareal på 8-10 gange dyrets størrelse, og en stor hun får gerne mere.

TEMPERATUR
Om dagen holdes terrariet på 24-28 °C og om natten på 22-24 °C. *C. ornata* æder bedst i den varme ende og dårligere, når det er køligt. Over 30 °C eller under 18 °C i længere tid kan være dødeligt.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING
Luftfugtigheden holdes på 65-80 % hele året og hæves til omkring 90 % i parringstiden. Sprøjt let hver dag, så bunden er fugtig, men ikke våd.

VAND OG VANDKVALITET
Giv altid en lav skål med frisk, behandlet vand, stor nok til at hele frøen kan ligge i den, og med vandet højst op til frøens mund. Frøen svømmer dårligt og skal kunne hvile med hovedet over vandet og komme op uden besvær.

LYS OG UVB
UVB er ikke nødvendigt, men et svagt UVB-rør (Ferguson-zone 1) kan være til gavn, fordi frøen i naturen får lidt UV. Hæng det over den ene side, så der altid er skygge i resten, og giv ikke albinoer UVB, da de er følsomme for lys.

FODER
Arten æder næsten alt, der kan komme ind i munden. I naturen æder voksne frøer især hvirveldyr som mus, små fugle, firben og andre frøer, men også store edderkopper og insekter.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Ceratophrys ornata er en stillesiddende frø, der ligger nedgravet det meste af tiden og kun kommer frem for at æde. Den er ikke et dyr til at tage op. Den kan springe efter en hånd, der kommer for tæt på, og bidet gør ondt.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Argentina, Uruguay og Brasilien.