herpy

FRØER

Chaco Horned Frog

Chacophrys pierottii

Chacophrys pierottii er en lille, rund hornfrø fra tørskov og krat i Gran Chaco i Sydamerika. Den bliver 5-7 cm, graver sig ned i løs jord og tilbringer den tørre tid i en kokon af afstødt hud. Arten skal bo alene, æder mest insekter og ses sjældent i terrarier, så der findes kun lidt viden om pasningen.

Familie: Ceratophryidae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**5-7 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**3-5 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Savanne og tørskov**
Hudgift	**Ingen kendt**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 30 × 25 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Temperatur, nat	**22-24 °C**
Luftfugtighed	**50-70 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**I vand**
Æg pr. lægning	**900-2.000**
Larvetid	**14 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står ikke på CITES-listerne, så der kræves ingen CITES-papirer. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og angives derfor ikke her. Køb opdrættede dyr, og bed om dokumentation for oprindelsen.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Chacophrys pierottii*. Anbefalingerne her er lånt fra *Ceratophrys cranwelli*, som lever i samme område og har samme kropsbygning og levevis.
TEMPERATUR	Om dagen holdes terrariet på 24-28 °C og om natten på 22-24 °C, som passer til den varme, regnfulde tid, hvor frøen er aktiv. Der er ikke brug for en varmeplads, men en varmemåtte på siden af terrariet holder temperaturen stabil.
LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING	Luftfugtigheden holdes på 50-70 %. Substratet skal være let fugtigt hele vejen ned. Forstøv hver aften, så de øverste centimeter bliver fugtige uden at stå i vand.
VAND OG VANDKVALITET	Giv en lav, bred vandskål, hvor frøen kan sidde uden at skulle svømme og let komme op igen; den optager vand gennem huden. Skift vandet dagligt, og brug postevand behandlet mod klor og kloramin.
LYS OG UVB	UVB er ikke nødvendigt for *Chacophrys pierottii*, men et svagt UVB-rør (Ferguson-zone 1) giver en tydelig døgnrytme og gør ikke skade, så længe frøen kan grave sig ned. Natten skal være mørk.
FODER	Voksne dyr æder i naturen mest insekter som biller, bier, myrer og sommerfuglelarver og en gang imellem andre frøer.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Chacophrys pierottii* er en enspænder, der ligger nedgravet og stille i lang tid og slår til, når byttet kommer forbi. Den er mest aktiv om natten.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Argentina, Bolivia og Paraguay.