herpy

FRØER

Tomato Frog

Dyscophus antongilii

Dyscophus antongilii er en frø fra Madagaskars nordøstlige lavland: rund, kraftig og ensartet orange til dybt rød. Hunnen bliver op til 11 cm og over 200 g, hannen er mindre og mere afdæmpet. Den ligger nedgravet om dagen og jager om natten, og den er rolig og robust at holde, når temperatur, fugt og hygiejne er i orden.

Familie: Microhylidae **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**7-11 cm** snude-kloak-længde
Vægt	**40-230 g**
Levetid	**6-10 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Regnskov og vådområde**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Øvet**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**I vand**
Kønsmoden	**9-24 mdr.**
Æg pr. lægning	**1.000-1.500**
Klækning	**1-2 dage**
Larvetid	**45 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 35 × 35 cm** L × B × H til 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**23-27 °C**
Temperatur, nat	**18-21 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller i gruppe**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Dyscophus antongilii står på CITES liste II (tidligere liste I). Handel over landegrænser kræver CITES-papirer, også for opdrættede dyr, og papirerne bør følge dyret ved køb og salg. Også opdrættede unger skal have papirer, før de sælges videre, og det tager tid at skaffe dem. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og angives derfor ikke her.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et par eller tre dyr skal have et terrarie på mindst 60 × 35 × 35 cm (længde × bredde × højde). Bundarealet betyder mere end højden, for *D. antongilii* lever på jorden og graver.
TEMPERATUR	*Dyscophus antongilii* tåler et bredt temperaturspænd og trives ved almindelig stuetemperatur. Om dagen skal der være 23-27 °C og om natten 18-21 °C.
LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING	Luftfugtigheden skal ligge på 60-80 %. Forstøv let en gang om dagen eller hver anden til tredje dag, alt efter hvor hurtigt terrariet tørrer, og brug et hygrometer.
VAND OG VANDKVALITET	Stil en vandskål med afkloreret vand, så stor, at frøen kan sidde i den, og mindst så dyb, som frøen er høj. De fleste frøer bader i skålen om natten, så skift vandet hver morgen.
LYS OG UVB	Arten er nataktiv og har ikke brug for UVB, men et svagt UVB-lys (omtrent Ferguson-zone 1) skader ikke og kan gives. Til levende planter bruges et dagslysrør som til akvarier.
FODER	*Dyscophus antongilii* æder kun levende foder.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Dyscophus antongilii* er rolig og hemmelighedsfuld. Den ligger det meste af dagen nedgravet og kommer frem om natten. Voksne dyr kan blive noget tamme, men tåler i bedste fald håndtering, så tag den kun op, når det er nødvendigt.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Madagaskar.