herpy

FRØER

Sambava Tomato Frog

Dyscophus guineti

Dyscophus guineti er en kraftig, rund og halvt gravende frø fra Madagaskars østlige regnskov. Hunnen er rødorange og op mod 10 cm, hannen mindre og mere gullig. Om dagen ligger den nedgravet, om natten jager den, og den er rolig og robust at holde, når temperatur, fugt og hygiejne er i orden.

Familie: Microhylidae Udgivet 15. november 2026 **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**6-10 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**6-10 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Regnskov og vådområde**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 35 × 35 cm** L × B × H til 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-27 °C**
Temperatur, nat	**18-21 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**I vand**
Kønsmoden	**9-24 mdr.**
Æg pr. lægning	**200-3.000**
Klækning	**2-4 dage**
Larvetid	**28-45 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Slægten Dyscophus står på CITES liste II. Handel over landegrænser kræver CITES-papirer, også for opdrættede dyr, og papirerne bør følge dyret ved køb og salg. Madagaskar stoppede den lovlige eksport i 2019. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og angives derfor ikke her.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et akvarie på omkring 60 × 35 × 35 cm (længde × bredde × højde) er nok til et par eller tre dyr, og et terrarie på 75 × 30 × 30 cm eller 45 × 45 × 30 cm til et par.

TEMPERATUR
Dyscophus guineti tåler et bredt temperaturspænd og trives godt ved almindelig stuetemperatur. Om dagen skal der være 22-27 °C, og om natten må det falde til omkring 18 °C; selv 15 °C om natten kan gå fint.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING
Luftfugtigheden skal ligge på 60-80 %. Sprøjt let en gang om dagen eller hver anden til tredje dag, alt efter hvor hurtigt terrariet tørrer, og brug et hygrometer.

VAND OG VANDKVALITET
Stil en vandskål med afkloreret vand, så stor, at frøen kan sidde i den, og mindst så dyb, som frøen er høj. De fleste frøer bader i skålen om natten, så skift vandet hver morgen.

LYS OG UVB
Arten er nataktiv og har ikke brug for UVB, men et svagt UVB-lys (omtrent Ferguson-zone 1) skader ikke og kan gives. Til levende planter bruges et dagslysrør som til akvarier.

FODER
Dyscophus guineti æder kun levende foder.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Dyscophus guineti er rolig og hemmelighedsfuld. Den ligger det meste af dagen nedgravet og kommer frem om natten. Voksne dyr kan blive noget tamme, men tåler i bedste fald håndtering, så tag den kun op, når det er nødvendigt.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Madagaskar.