herpy

FRØER

Riggenbach's Reed Frog

Hyperolius riggenbachi

En lille, farvestærk højlandsfrø fra Cameroun og det østlige Nigeria, med snirklede tegninger i sort, rødt og gult og en orange til rød bug. *Hyperolius riggenbachi* er nataktiv, lever af små insekter, kræver et højt, lyst terrarie og yngler i vand, når regnen sætter ind.

Familie: Hyperoliidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**3-4 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**4-12 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Bjergskov og vådområde**
Hudgift	**Ingen kendt**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 30 × 40 cm** L × B × H til 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-26 °C**
Temperatur, nat	**17-20 °C**
Luftfugtighed	**65-80 %**
Vand	**Vandskål** dybde 3-5 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**I gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**I vand**
Kønsmoden	**12 mdr.**
Æg pr. lægning	**30-300**
Klækning	**6-8 dage**
Larvetid	**45-120 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES-listerne, så der kræves ingen CITES-papirer. Dyr i handlen er oftest vildfangne, så spørg efter opdrættede dyr. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Til fire voksne dyr bør terrariet mindst være 60 × 30 × 40 cm (længde × bredde × højde).
TEMPERATUR	Om dagen skal temperaturen i terrariet være 21-26 °C, og om natten må den falde til 17-20 °C. Et fald på omkring 5 °C om natten svarer til en højlandsart og er sundt. Sluk al belysning om natten.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden skal ligge på 65-80 %. Tallet er ikke dokumenteret for arten, men lånt fra *Hyperolius pickersgilli*. Sprøjt terrariet med lunkent, rent vand hver aften, når frøerne vågner, og gerne let igen om dagen.
VAND OG VANDKVALITET	Stil en bred, lav vandskål på 3-5 cm dybde i terrariet, og hold den fuld hele tiden. Frøerne sidder ofte i vandet om natten og dykker ned, når de bliver forskrækkede.
LYS OG UVB	Frøen får gavn af kraftigt lys, så et lyst terrarie er et godt udgangspunkt. Brug lysrør eller LED med en farvetemperatur på 5.000-6.500 K, der dækker hele terrariets længde, og tænd dem 12 timer om dagen på et tænd-sluk-ur.
FODER	Frøen er en glubsk lille jæger, der tager de fleste insekter på størrelse med hovedet eller mindre. Grundfoderet er små fårekyllinger på 6-10 mm og flyvedygtige bananfluer. Variér med husfluer og små møl.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Hyperolius riggenbachi* er nataktiv og hurtig. Om dagen sidder dyrene stille på blade og ruder, og om natten jager de, svømmer i vandskålen og kalder.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Cameroun og Nigeria.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/froer/hyperolius-riggenbachi