herpy

FRØER

Common Reed Frog

Hyperolius viridiflavus

En lille, hurtig rørfrø fra det østlige og centrale Afrika, der fra savannens vandhuller til haver og marker kalder som en xylofon i skumringen. *Hyperolius viridiflavus* skifter farve med alder og køn, er nataktiv og lever af små insekter. Den kræver et højt, lyst terrarie med mange planter og yngler i vand, når regnen sætter ind.

Familie: Hyperoliidae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**2-3 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**1-2 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Savanne og vådområde**
Hudgift	**Ingen kendt**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 30 × 45 cm** L × B × H til 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-27 °C**
Hotspot	**29-32 °C**
Temperatur, nat	**18-21 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Vandskål** dybde 3-5 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**I gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**I vand**
Kønsmoden	**4-12 mdr.**
Æg pr. lægning	**94-800**
Klækning	**2-5 dage**
Larvetid	**56-120 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES-listerne, så der kræves ingen CITES-papirer. Dyr i handlen er oftest vildfangne og sælges nogle gange uden artsbestemmelse, så spørg efter opdrættede dyr. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Fire voksne dyr skal have et terrarie på mindst 60 × 30 × 45 cm (længde × bredde × højde). Arten er lille, men hurtig og udnytter hele terrariet, så højde og mange siddepladser er vigtigere end gulvareal.
TEMPERATUR	Om dagen skal temperaturen i terrariet være 22-27 °C, og om natten 18-21 °C. Et fald på omkring 5 °C om natten er naturligt og sundt. Al belysning slukkes om natten.
LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING	Luftfugtigheden skal ligge på 60-80 %. Forstøv terrariet med rent, lunkent vand hver aften, når frøerne vågner, og gerne let igen i løbet af dagen. Frøerne drikker og optager vand fra blade og vægge, så fugtige blade er vigtige.
VAND OG VANDKVALITET	Stil en bred, lav vandskål på 3-5 cm dybde i terrariet, og hold den fuld hele tiden. Frøerne er gode svømmere, sidder ofte i vandet om natten og dykker ned, når de forskrækkes.
LYS OG UVB	Arten har brug for kraftigt lys. Brug lysrør eller LED med en farvetemperatur på 5.000-6.500 K, der dækker hele terrariets længde, og tænd dem 12 timer om dagen på et tænd-sluk-ur. Kraftigt hvidt lys fremmer farver og aktivitet.
FODER	Arten er en glubsk lille jæger, der tager de fleste insekter på størrelse med hovedet eller mindre. Grundfoderet er små fårekyllinger på 5-8 mm og flyvedygtige bananfluer. Variér med husfluer og små møl.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Hyperolius viridiflavus* er nataktiv og hurtig. Om dagen sidder dyrene stille på blade og ruder, og om natten jager de, svømmer i vandskålen og kalder. Kaldet er tonalt og minder om en xylofon.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Etiopien, Sydsudan, Sudan, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Congo-Kinshasa og Tanzania.