herpy

FRØER

Bubbling Kassina

Kassina senegalensis

En lille, kompakt frø med store øjne og gråsort ryg med brune længdebånd. Den lever i savanner og vådområder over store dele af Afrika syd for Sahara. *Kassina senegalensis* går og løber hellere, end den hopper, er aktiv i skumringen og om natten og er kendt for et eksplosivt, boblende kald.

Familie: Hyperoliidae Tidligere navn: *Cystignathus senegalensis* **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**3-4 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Savanne og vådområde**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H til 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Temperatur, nat	**20-23 °C**
Luftfugtighed	**50-80 %**
Vand	**Vandskål** dybde 5 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**I vand**
Æg pr. lægning	**100-600**
Klækning	**5-6 dage**
Larvetid	**50-90 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES-listerne, så der kræves ingen CITES-papirer. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Der findes kun lidt direkte viden om pasningen af *Kassina senegalensis*. Arten regnes dog for let at holde, og anbefalingerne her bygger på levestedet og på den nært beslægtede *Phlyctimantis maculatus*.

TEMPERATUR
Om dagen skal temperaturen være 24-27 °C, og om natten 20-23 °C. Temperaturen må ikke komme over 30 °C, for arten bliver stresset og inaktiv i varmen.

LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING
Luftfugtigheden skal ligge på 50-80 %, lavest om dagen (omkring 50-70 %) og højere om natten (omkring 70-80 %). Tallene er lånt fra den beslægtede *Phlyctimantis maculatus*.

VAND OG VANDKVALITET
Stil en skål eller et lille vandparti på mindst 5 cm dybde i terrariet, og hold det rent hele tiden. Vandet må højst tage omkring en fjerdedel af bundarealet.

LYS OG UVB
Arten er aktiv fra skumring og om natten, men lever i åbne, lyse landskaber, og et lyst terrarie med lysrør eller LED på 5.000-6.500 K i hele terrariets længde er et godt udgangspunkt.

FODER
Arten er en alsidig jæger, der tager insekter og andre leddyr på størrelse med hovedet eller mindre.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Kassina senegalensis er skumrings- og nataktiv. Om dagen sidder eller graver dyrene sig ned i skjul, og om natten går de på jagt, løber på jorden og kalder.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Senegal, Gambia, Guinea, Elfenbenskysten, Ghana, Benin, Nigeria, Mali, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Congo-Brazzaville, Sudan, Sydsudan, Etiopien, Somalia, Uganda, Rwanda, Kenya, Tanzania, Angola, Zambia, Malawi, Mozambique, Zimbabwe, Namibia, Botswana, Sydafrika, Eswatini og Lesotho.