herpy

FRØER

Budgett's Frog

Lepidobatrachus laevis

Lepidobatrachus laevis er en bred, flad vandfrø fra Gran Chaco i Sydamerika med en mund, der fylder næsten hele hovedet. Den ligger på lur i lavt vand med kun øjne og næsebor over overfladen og sluger alt, den kan overmande. Arten bliver 8-15 cm, skal bo alene og bider hårdt nok til at trække blod, så den er et dyr at se på, ikke at tage op.

Familie: Ceratophryidae Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**8-15 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-20 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Gravende og semi-akvatisk**
Biotop	**Savanne, tørskov og vådområde**
Hudgift	**Ingen kendt**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 30 × 40 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Temperatur, nat	**20-23 °C**
Luftfugtighed	**60-70 %**
Vand	**Akvaterrarie** dybde 5-23 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**I vand**
Kønsmoden	**12 mdr.**
Æg pr. lægning	**1.400**
Larvetid	**14 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Andre haletudser**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Ikke opført på CITES ifølge opslagstabellen, så der kræves ingen CITES-papirer. EU-bilaget er ikke aflæst for frøer og er derfor udeladt.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Trods størrelsen kræver arten ikke et stort terrarie. Et voksent dyr klarer sig i et akvarium på omkring 60 × 30 × 40 cm, og en ung frø på 4-6 cm i omkring 30 × 25 × 25 cm.

TEMPERATUR

Om dagen holdes vand og luft på 24-28 °C og om natten på 20-23 °C. I koldt vand æder frøen dårligt og bliver lettere syg, så en termostatstyret akvarievarmer er nødvendig i de fleste stuer.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING

Luftfugtigheden holdes på 60-70 %, og det klarer den store vandflade næsten af sig selv. Vigtigere er god ventilation, for stillestående, fugtig luft giver hurtigt bakterielle hudinfektioner.

VAND OG VANDKVALITET

Vandet er frøens hjem, og vandkvaliteten er det vigtigste i hele pasningen. Unge dyr skal have 5-8 cm vand, voksne 15-23 cm, eller omkring tre gange frøens kropshøjde.

LYS OG UVB

UVB er ikke nødvendigt for *Lepidobatrachus laevis*. Lys er heller ikke strengt nødvendigt, men et almindeligt akvarierør på 12 timer om dagen giver en tydelig døgnrytme og holder planterne i live.

FODER

Lepidobatrachus laevis er et rovdyr og æder alt, den kan overmande. Grundfoderet er regnorme, fårekyllinger, græshopper, kakerlakker og voksmøllarver, gerne afvekslet med afskallede snegle.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Lepidobatrachus laevis er en enspænder, der ligger stille i timevis og derefter slår til. Den er mest aktiv om natten. Hannerne kalder med en høj, skræppende lyd fra en plads, hvor de kan stå med hovedet lige over vandet.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Argentina, Bolivia og Paraguay.