herpy

FRØER

Llanos Frog

Lepidobatrachus llanensis

Lepidobatrachus llanensis er en bred, fladtrykt vandfrø fra det tørre Gran Chaco i Sydamerika og den nærmeste slægtning til *Lepidobatrachus laevis*. Den ligger på lur i lavt vand, graver sig ned og danner en kokon i tørtiden. Arten er sjælden i fangenskab, og der findes næsten ingen viden om pasningen. Den skal bo alene og bider, så den er et dyr at se på, ikke at tage op.

Familie: Ceratophryidae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**7-10 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-15 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Gravende og semi-akvatisk**
Biotop	**Halvørken og savanne**
Hudgift	**Ingen kendt**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 30 × 40 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Temperatur, nat	**20-23 °C**
Luftfugtighed	**60-70 %**
Vand	**Akvaterrarie** dybde 5-20 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**I vand**
Æg pr. lægning	**1.400**
Larvetid	**14 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Andre haletudser**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står ikke på CITES-listerne, så der kræves ingen CITES-papirer. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og angives derfor ikke her. Køb opdrættede dyr, og bed om dokumentation for oprindelsen.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes meget lidt viden om pasningen af *Lepidobatrachus llanensis*, og arten holdes kun sjældent.
TEMPERATUR	Om dagen holdes vand og luft på 24-28 °C og om natten på 20-23 °C. Koldt vand gør frøen ædedårlig og mere modtagelig for sygdom, så en termostatstyret varmer er nødvendig i de fleste stuer. Over 30 °C kan hurtigt blive farligt.
LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING	Luftfugtigheden holdes på 60-70 %, og det klarer den store vandflade næsten af sig selv. God ventilation er vigtigere end fugt: mindst halvdelen af låget skal være net, for stillestående, fugtig luft giver hudinfektioner.
VAND OG VANDKVALITET	Vandet er frøens hjem, og vandkvaliteten er det vigtigste i pasningen. Vandet er 5-20 cm dybt, og frøen skal altid kunne nå både overfladen og land uden at svømme.
LYS OG UVB	UVB er ikke nødvendigt. Et almindeligt lysrør i 12 timer om dagen giver en tydelig døgnrytme. Om natten skal der være mørkt, for arten er formentlig mest aktiv om aftenen og natten.
FODER	Arten er et rovdyr og tager alt, den kan overmande. Fodringen er lånt fra *L. laevis*: regnorme, fårekyllinger, græshopper, kakerlakker og voksmøllarver.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Lepidobatrachus llanensis* lever som enspænder og skal holdes alene: haletudserne æder hinanden, og voksne frøer af slægten kan æde artsfæller.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Argentina, Bolivia og Paraguay.