herpy

FRØER

## Amani Forest Treefrog

# *Leptopelis vermiculatus*

En stor, storøjet træfrø fra regnskoven i det østlige Tanzania, der optræder i en grøn og en brun fase: grøn med fine sorte pletter eller brun med en mørk trekant på ryggen. *Leptopelis vermiculatus* er nataktiv, bliver op til 9 cm og er sjælden i fangenskab. Arten er truet i naturen og kræver et fugtigt, højt terrarie med kølige nætter.

Familie: Arthroleptidae  Tidligere navn: *Hylambates vermiculatus*

## SPECIFIKATIONER

### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **3-9 cm**<br>snude-kloak-længde |
| Levetid | **4-8 år** |
| Aktiv | **Skumring og nat** |
| Levevis | **Træboende** |
| Biotop | **Regnskov og bjergskov** |
| Hudgift | **Ingen kendt** |
| Sværhedsgrad | **Erfaren** |

### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **45 × 45 × 60 cm**<br>L × B × H til 2 voksne dyr |
| Temperatur, dag | **22-27 °C** |
| Temperatur, nat | **18-21 °C** |
| Luftfugtighed | **65-85 %** |
| Vand | **Vandskål**<br>dybde 3-5 cm |
| UVB | **Valgfri**<br>Ferguson-zone 1 |
| Kost | **Insekter** |
| Holdes | **Parvis** |

### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Æglæggende** |
| Udvikling | **Haletudser i vand** |
| Æglægning | **På jorden** |
| Æg pr. lægning | **50-200** |
| Larvetid | **60-120 dage**<br>fra klækning til metamorfose |
| Larvefoder | **Alger/planter og færdigfoder** |
| Yngelpleje | **Ingen** |

### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ikke omfattet** |
| IUCN | **Truet (EN)** |

Arten er ikke opført på CITES-listerne, så der kræves ingen CITES-papirer. Dyr i handlen er ofte vildfangne. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

## Pasning i korte træk

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Der findes kun lidt viden om pasningen af *Leptopelis vermiculatus*, og dyr i handlen er ofte vildfangne. |
| **TEMPERATUR** | Om dagen skal temperaturen i terrariet være 22-27 °C, og om natten skal den falde til 18-21 °C. Nattefaldet svarer til et højlandsklima og er sundt. |
| **LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING** | Luftfugtigheden skal ligge på 65-85 %. Forstøv terrariet med lunkent, rent vand en gang om aftenen og gerne let en gang igen om morgenen, så blade og vægge er våde, og luften bliver fugtig. |
| **VAND OG VANDKVALITET** | Giv dyrene en bred, lav vandskål på 3-5 cm vand, som holdes fuld hele tiden. Hannerne kalder, mens de sidder i vand, så skålen skal være stor nok til, at en hun og to hanner kan sidde der. |
| **LYS OG UVB** | Arten er mest aktiv i skumringen og om natten og lever i skyggen under tæt skov. Den skal have et lysrør eller en LED-lampe med en farvetemperatur på 5.000-6.500 K, som dækker hele terrariet, så planterne trives. |
| **FODER** | Arten tager alle insekter, den kan overmande, og er en glubsk jæger. Grundfoder er middelstore til store fårekyllinger. Tropiske kakerlakker er et godt supplement, og de holdes let som egne foderkulturer. |
| **ADFÆRD OG HÅNDTERING** | *Leptopelis vermiculatus* er nataktiv og territorial. Om dagen sidder dyrene stille og skjult i planter, og i skumringen og om natten jager de og kalder. |
| **OPRINDELIG UDBREDELSE** | Tanzania. |