herpy

FRØER

Baron's Mantella

Mantella baroni

En lille, dagaktiv frø fra de østlige skove på Madagaskar, sort med orange og sorte tigerstriber på bagbenene og lysegrønne pletter ved lemmerne. *Mantella baroni* bliver omkring 3 cm, er en af de største i slægten og lever af myrer og andre små leddyr. Den er nem at holde, når terrariet står køligt, men tåler ikke varme.

Familie: Mantellidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**2-3 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Begynder**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 30 cm** L × B × H til 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-24 °C**
Temperatur, nat	**16-18 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**I gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**På jorden**
Kønsmoden	**12-18 mdr.**
Æg pr. lægning	**50-130**
Klækning	**3-12 dage**
Larvetid	**42-56 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Står på CITES liste II (hele slægten Mantella), så handel over landegrænser kræver CITES-papirer. Køb kun dyr med dokumentation for, at de er lovligt opdrættet eller indført.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Et terrarie med en bund på 45 × 45 cm rummer en gruppe på fire til seks voksne dyr, og et akvarium på omkring 40 liter er nok til et par. Frøen bor på jorden, så bundarealet er vigtigere end højden, og 30 cm i højden er rigeligt.

TEMPERATUR

Mantella baroni trives ved almindelig stuetemperatur, 21-24 °C om dagen, og om natten må temperaturen falde til 16-18 °C.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING

Arten tåler et bredt spænd i luftfugtighed, men har det bedst ved 60-70 % til daglig og op til 80 % i yngletiden. Sprøjt terrariet dagligt med afkalket vand, kraftigt i varmt vejr og lidt mindre, når det er koldt.

VAND OG VANDKVALITET

Stil en lav vandskål i terrariet, og lad den altid være fyldt. Frøerne er dårlige svømmere, så skålen skal være så lav, at de let kan komme op, og den må ikke fylde meget af bunden.

LYS OG UVB

Der er ikke dokumenteret noget behov for UVB hos arten. Den er dog aktiv i delvist sollys i naturen, så et svagt UVB-lys (Ferguson-zone 1) er formentlig en fordel, når der er skygge og planter, så dyrene kan vælge.

FODER

Frøen er en ivrig jæger og kan som voksen æde større byttedyr end de fleste andre arter i slægten. I naturen lever den mest af myrer og af biller, edderkopper og mider.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Mantella baroni er dagaktiv og kan ses patruljere i sit territorium og jage mad det meste af dagen. Hannerne kalder med korte, enkelte klik i dagtimerne for at forsvare området og tiltrække hunner, og de kan brydes med hinanden.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Madagaskar.