herpy

FRØER

Bernhard's Mantella

Mantella bernhardi

Mantella bernhardi er den mindste frø i slægten, kun 19-22 mm, med sorte flanker og orange indersider på lemmerne. Den lever i fugtig lavlandsskov i det sydøstlige Madagaskar. Arten er sårbar i naturen, og der findes næsten ingen viden om pasningen, så vejledningen bygger på slægtens krav: køligt, fugtigt og små leddyr.

Familie: Mantellidae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**19-22 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**4-8 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov og vådområde**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 30 cm** L × B × H til 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-23 °C**
Temperatur, nat	**16-18 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**I gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**På jorden**
Kønsmoden	**12-18 mdr.**
Æg pr. lægning	**12-30**
Klækning	**3-12 dage**
Larvetid	**56-112 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Står på CITES liste II (hele slægten Mantella), så handel over landegrænser kræver CITES-papirer, og sælgeren skal kunne dokumentere, at dyrene er lovligt opdrættet. Arten er sårbar på IUCN's rødliste, og indsamling i naturen er stærkt begrænset, så vælg opdræt frem for vildfangede dyr. EU-bilaget er ikke aflæst for frøer og er derfor udeladt.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes næsten ingen viden om pasningen af *Mantella bernhardi*, og arten holdes kun sjældent. Pasningen bygger derfor på levestedet i fugtig lavlandsskov og på slægtens krav.
TEMPERATUR	Om dagen skal der være 20-23 °C og om natten 16-18 °C. Tallene er lånt fra *M. aurantiaca*. Arten lever i lavlandet, men om den tåler mere varme end slægtens øvrige arter, er ikke dokumenteret.
LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING	Luftfugtigheden skal være 70-100 %. Forstøv terrariet dagligt med afkalket vand, kraftigt i varmt vejr og lidt mindre, når det er koldt. Bunden skal være fugtig, men ikke vandfyldt.
VAND OG VANDKVALITET	Stil en lav vandskål i terrariet, og lad den altid være fyldt. Frøerne er dårlige svømmere, så skålen skal være så lav, at de let kommer op, og den må ikke fylde meget af bunden.
LYS OG UVB	UVB er ikke dokumenteret som nødvendigt for arten. Et svagt UVB-lys (Ferguson-zone 1) er en mulighed, når der er skygge og planter, så dyrene kan vælge, men det er valgfrit. Lys til planterne må ikke give varme.
FODER	*M. bernhardi* er den mindste i slægten, så foderet skal være mindre end hos de andre. Slægten jager myrer, mider og andre små leddyr.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*M. bernhardi* er dagaktiv. Hannerne kalder fra løvlaget, og de forsvarer territorier mod hinanden. Dyrene holdes bedst i en lille gruppe med mange skjul og god plads. Frøer bør så vidt muligt ikke håndteres.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Madagaskar.