herpy

FRØER

Cowan's Mantella

Mantella cowanii

Mantella cowanii er en lille, dagaktiv frø fra højlandet i det centrale Madagaskar, blank sort med knaldrøde til orange lemmer. Den bliver omkring 2-3 cm og er en af de mest varmefølsomme i slægten: terrariet skal stå køligt hele året. Arten er truet i naturen, så kun opdrættede dyr bør komme på tale.

Familie: Mantellidae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**2-3 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Bjergskov og vådområde**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 30 cm** L × B × H til 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**18-21 °C**
Temperatur, nat	**16-18 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**I gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**På jorden**
Kønsmoden	**12-18 mdr.**
Æg pr. lægning	**50-130**
Klækning	**3-12 dage**
Larvetid	**56-98 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Truet (EN)**

Står på CITES liste II (hele slægten Mantella), så handel over landegrænser kræver CITES-papirer, som udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Arten er truet på IUCN's rødliste, så vælg opdræt, og køb kun dyr med dokumentation for, at de er lovligt opdrættet. EU-bilaget er ikke aflæst for frøer og er derfor udeladt.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Mantella cowanii*. Arten er sjælden i fangenskab og holdes mest uden avl.
TEMPERATUR	Om dagen skal der være 18-21 °C og om natten 16-18 °C. Det er køligere end for andre arter i slægten, fordi arten kommer fra højlandet i 1.300-2.140 meters højde.
LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING	Luftfugtigheden skal være 60-80 % (lånt fra *M. baroni*), og bunden fugtig, men ikke vandfyldt. Forstøv terrariet dagligt med afkalket vand.
VAND OG VANDKVALITET	Stil en lav vandskål i terrariet, og hold den fyldt. Frøerne er dårlige svømmere, så skålen skal være så lav, at de let kommer op af den. Dybden er ikke dokumenteret; et par centimeter er rigeligt.
LYS OG UVB	Behovet for UVB er ikke dokumenteret for arten, men den er dagaktiv, så et svagt UVB-lys (Ferguson-zone 1) er formentlig en fordel, når der er skygge og planter, så dyrene kan vælge. Lys til planterne må ikke give varme.
FODER	I naturen lever arten af myrer, tusindben og mider. I terrariet fodres den med små leddyr: springhaler, bananfluer uden vinger, nyklækkede fårekyllinger, bænkebidere, små larver af sort soldaterflue og små kakerlakkelarver.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Mantella cowanii* er dagaktiv og kan ses patruljere og jage mad det meste af dagen. Hannerne kalder med korte, enkelte klik og forsvarer deres område. Dyrene holdes bedst i en gruppe med mange skjul og plads.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Madagaskar.