herpy

FRØER

Ebenau's Golden Frog

Mantella ebenaui

Mantella ebenaui er en lille, dagaktiv frø fra det nordlige Madagaskar. Den er lysebrun til kobberfarvet på ryggen, ofte med et lyst X-mønster, og sort på siderne, og den bliver 20-26 mm. Arten har en af de største udbredelser i slægten, tåler varme godt og lægger æggene på land nær vand. Der findes kun lidt viden om pasningen af netop denne art.

Familie: Mantellidae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**20-26 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**4-8 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Tørskov og regnskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 30 × 30 cm** L × B × H til 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, nat	**18-21 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**I gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**På jorden**
Æg pr. lægning	**25-30**
Larvetid	**56-70 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Står på CITES liste II (hele slægten Mantella), så handel over landegrænser kræver CITES-papirer. Køb kun dyr med dokumentation for, at de er lovligt opdrættet eller indført. EU-bilaget er ikke slået op.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Mantella ebenaui*, og arten har fået lidt opmærksomhed i hobbyen.
TEMPERATUR	Fordi arten lever i lavlandet, tåler den varme bedre end mange andre i slægten. Brug 22-26 °C om dagen og 18-21 °C om natten; tallene er lånt fra slægten og tilpasset artens lavlandsklima.
LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING	Hold luftfugtigheden på 70-100 %. Høj luftfugtighed får dyrene til at vise sig mere.
VAND OG VANDKVALITET	Stil en lav vandskål i terrariet, og hold den altid fyldt. Dybden er 1-2 cm, så dyrene let kan komme op og ned. Brug regnvand, osmosevand eller afkloreret postevand, og skift vandet jævnligt.
LYS OG UVB	Lyset skal passe til planterne, men må ikke varme terrariet. Giv 10-12 timers dag og mørke om natten. Der er ikke dokumentation for, at arten har brug for UVB.
FODER	Arten er mikrofag og æder små leddyr. Hovedfoderet er bananfluer, springhaler, små isopoder og nyklækkede fårekyllinger. Variér foderet med bladlus, kakerlakunger, termitter og små voksmøllarver, så der ikke opstår mangler.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er sky i fangenskab og gemmer sig meget, men kommer mere frem ved høj luftfugtighed og passende varme. Hannerne er territoriale og forsvarer steder, hvor de kalder, mens hunnerne er mere tilbagetrukne.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Madagaskar.