herpy

FRØER

Blue-legged Mantella

Mantella expectata

Mantella expectata er en lille, dagaktiv frø fra de tørre klippekløfter i Isalo-massivet i det sydvestlige Madagaskar: citrongul på ryggen, med himmelblå ben og sort på siderne. Den bliver 2-3 cm, lever af myrer og andre små leddyr og lever kort: i naturen bliver den højst tre år. Den skal holdes tørrere og lidt varmere end de fleste andre arter i slægten.

Familie: Mantellidae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**2-3 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**3-5 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Halvørken og klippeterræn**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 30 cm** L × B × H til 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-26 °C**
Temperatur, nat	**16-20 °C**
Luftfugtighed	**50-70 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**I gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**På jorden**
Æg pr. lægning	**25-30**
Klækning	**3-12 dage**
Larvetid	**42-56 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Truet (EN)**

Står på CITES liste II (hele slægten Mantella), så handel over landegrænser kræver CITES-papirer, og sælgeren skal kunne dokumentere, at dyrene er lovligt opdrættet. Arten er truet (EN) på IUCN's rødliste, så vælg opdræt frem for vildfangede dyr. EU-bilaget er ikke aflæst for frøer og er derfor udeladt.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun begrænset viden om pasningen af *Mantella expectata*. Arten avles kun af og til i fangenskab.
TEMPERATUR	Om dagen skal der være 20-26 °C, og om natten 16-20 °C. Frøen tåler mere varme end de fleste andre arter i slægten, og en dag med 28 °C gør ikke noget. I den kunstige regntid må dagtemperaturen nå op mod 30 °C.
LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING	Arten kommer fra et tørt område og skal have mindre luftfugtighed end regnskovsarterne. Hold 50-70 % til daglig.
VAND OG VANDKVALITET	Stil en lav vandskål i terrariet, og lad den altid være fyldt. Mantella-frøer er dårlige svømmere, så skålen skal være så lav, at de let kan komme op, og den må ikke fylde meget af bunden.
LYS OG UVB	Der er ikke dokumenteret noget behov for UVB hos arten. Den lever dog i åbent, solbeskinnet terræn, så et svagt UVB-lys (Ferguson-zone 1) er formentlig en fordel, når der er skygge og skjul, så dyrene selv kan vælge.
FODER	Frøen er en ivrig jæger. I naturen lever den af myrer, mider og andre små leddyr. I terrariet tager den byttedyr helt op til 2-3 uger gamle fårekyllinger og foretrækker dem frem for bananfluer.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Mantella expectata* er dagaktiv og holder sig til sprækker og skygge i dagtimerne. Hannerne kalder og forsvarer små territorier. Uden for yngletiden er dyrene stort set fredelige over for hinanden.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Madagaskar.