herpy

FRØER

Haraldmeier's Mantella

Mantella haraldmeieri

Mantella haraldmeieri er en lille, dagaktiv frø på 21-27 mm fra de sydøstlige skove på Madagaskar, lysebrun på ryggen med sorte flanker, kobberfarvede bagben og røde markeringer på undersiden af benene. Arten er truet i naturen og holdes kun sjældent, så der findes meget lidt viden om pasningen. Den passes som de øvrige arter i slægten: køligt, fugtigt og aldrig varmt.

Familie: Mantellidae Tidligere navn: *Mantella madagascariensis haraldmeieri*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**21-27 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 30 cm** L × B × H til 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-24 °C**
Temperatur, nat	**16-18 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**I gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**På jorden**
Kønsmoden	**12-18 mdr.**
Æg pr. lægning	**50-130**
Klækning	**3-12 dage**
Larvetid	**42-56 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Truet (EN)**

Står på CITES liste II (hele slægten Mantella), så handel over landegrænser kræver CITES-papirer, og sælgeren skal kunne dokumentere, at dyrene er lovligt opdrættet. Arten er truet (EN) på IUCN's rødliste, så vælg kun opdræt. EU-bilaget er ikke aflæst for frøer og er derfor udeladt.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes meget lidt viden om pasningen af *Mantella haraldmeieri*, fordi arten kun sjældent holdes.
TEMPERATUR	Om dagen skal der være 21-24 °C og om natten 16-18 °C, svarende til en kølig stue. Varme skal undgås: over 27 °C kan hurtigt blive dødeligt for slægten. Tallene er lånt fra *M. baroni*. En sydvendt vindueskarm er for varm.
LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING	Luftfugtigheden skal være 60-70 % til daglig og op til 80 % i yngletiden (lånt fra *M. baroni*). Forstøv terrariet dagligt med afkalket vand, kraftigt i varmt vejr og lidt mindre, når det er køligt.
VAND OG VANDKVALITET	Stil en lav vandskål i terrariet, og lad den altid være fyldt. Frøerne er dårlige svømmere, så skålen skal være så lav, at de let kommer op af den, og den må ikke fylde meget af bunden.
LYS OG UVB	Der er ikke dokumenteret noget behov for UVB hos arten. Slægten er aktiv i delvist sollys i naturen, så et svagt UVB-lys (Ferguson-zone 1) er formentlig en fordel, når der er skygge og planter, så dyrene kan vælge.
FODER	*Mantella haraldmeieri* fodres med små leddyr: springhaler, bananfluer uden vinger, nyklækkede fårekyllinger, små bænkebidere, bladlus og larver af rismelbiller. Slægten tager byttedyr op til omkring 6 mm.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Frøen er dagaktiv og patruljerer sit område, når den jager. Hannerne kalder, forsvarer territorier og kan kæmpe med hinanden.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Madagaskar.