herpy

FRØER

Madagascan Mantella

Mantella madagascariensis

Mantella madagascariensis er en lille, dagaktiv frø fra regnskovene i det øst-centrale Madagaskar: sort med rødorange, sortplettede bagben, lysegrønne pletter ved forbenene og en himmelblå, hesteskoformet tegning på struben. Den bliver kun 21-25 mm, lever af myrer og andre små leddyr og kræver et køligt, fugtigt terrarie. Arten er sårbar i naturen, så vælg helst opdræt.

Familie: Mantellidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**21-25 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**4-8 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Øvet**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**På jorden**
Kønsmoden	**12-18 mdr.**
Æg pr. lægning	**12-30**
Klækning	**3-12 dage**
Larvetid	**56-112 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 30 × 30 cm** L × B × H til 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-23 °C**
Temperatur, nat	**16-18 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**I gruppe**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Står på CITES liste II (hele slægten Mantella), så handel over landegrænser kræver CITES-papirer, og sælgeren skal kunne dokumentere, at dyrene er lovligt opdrættet. Arten er sårbar på IUCN's rødliste, så vælg opdræt frem for vildfangede dyr. EU-bilaget er ikke aflæst for frøer og er derfor udeladt.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et lavt, fladt terrarie på mindst 60 × 30 × 30 cm (længde × bredde × højde) rummer en gruppe på fire voksne dyr. Frøen bor på jorden, så bundarealet er vigtigere end højden.

TEMPERATUR
Mantella madagascariensis trives køligt. Om dagen skal der være 20-23 °C, og om natten må temperaturen falde til 16-18 °C. Korte perioder op mod 24 °C kan klares, men længere tid med varme giver sygdom og kan slå dyrene ihjel.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING
Luftfugtigheden skal være høj det meste af tiden, 70-100 %, især når det er varmt. Sprøjt terrariet med afkloreret vand hver dag, kraftigt i varmt vejr og lidt mindre, når det er koldt. Bunden skal være fugtig, men ikke vandfyldt.

VAND OG VANDKVALITET
Stil en lav vandskål i terrariet, og lad den altid være fyldt. Frøerne er dårlige svømmere, så skålen skal være så lav, at de let kan komme op, og den må ikke fylde meget af bunden.

LYS OG UVB
Der er ikke dokumenteret noget behov for UVB hos arten, og frøerne klarer sig uden. Et svagt UVB-lys (Ferguson-zone 1) kan bruges som valgfrit tillæg, hvis der er skygge og planter, så dyrene kan vælge.

FODER
Frøen er en ivrig jæger og kan æde forholdsvis store byttedyr i forhold til sin størrelse. I naturen lever den mest af myrer og mider.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Mantella madagascariensis er dagaktiv og kan ses patruljere i sit område og jage mad det meste af dagen. Hannerne kalder fra løvlaget for at forsvare området og tiltrække hunner, og de kan brydes med hinanden.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Madagaskar.