herpy

FRØER

Marojejy Mantella

Mantella manery

Mantella manery er en lille, dagaktiv frø fra skovene i det nordlige Madagaskar, mørkebrun med en hvid stribe på siden af hovedet. Den er nær slægtning til *Mantella laevigata*. Arten er sårbar i naturen og kendt fra få fund, og der findes kun lidt viden om pasningen, så tallene her er lånt fra beslægtede arter.

Familie: Mantellidae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**2-3 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**4-8 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov og vådområde**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 30 cm** L × B × H til 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-26 °C**
Temperatur, nat	**17-22 °C**
Luftfugtighed	**80-100 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**I gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**På jorden**
Kønsmoden	**12-18 mdr.**
Æg pr. lægning	**12-30**
Klækning	**3-12 dage**
Larvetid	**42-98 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Står på CITES liste II (hele slægten Mantella), så handel over landegrænser kræver CITES-papirer, som udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Arten er sårbar (VU) på IUCN's rødliste, så køb kun dyr med dokumentation for, at de er lovligt opdrættet eller indført. EU-bilaget er ikke aflæst for frøer og er derfor udeladt.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Mantella manery*. Levestedet er løvlag ved vand i lavtliggende skov i det nordlige Madagaskar.
TEMPERATUR	Om dagen skal der være 20-26 °C og om natten 17-22 °C. Tallene er lånt fra *M. laevigata*, som også kommer fra lavlandet og tåler lidt mere varme end de fleste arter i slægten. Temperaturen må ikke komme over 27 °C i længere tid.
LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING	Luftfugtigheden skal være 80-100 % (lånt fra *M. laevigata*). Forstøv terrariet dagligt med afkalket vand, kraftigt i varmt vejr og lidt mindre, når det er køligt. Bunden skal være fugtig, men ikke vandfyldt.
VAND OG VANDKVALITET	Stil en lav vandskål i terrariet, og lad den altid være fyldt. Frøerne er dårlige svømmere, så skålen skal være så lav, at de let kan komme op, og den må ikke fylde meget af bunden.
LYS OG UVB	Behovet for UVB er ikke dokumenteret for arten. Et svagt UVB-lys i Ferguson-zone 1 er en fordel, når der er skygge og planter, så dyrene selv kan vælge. Lyset til planterne må ikke give varme.
FODER	Slægten tager byttedyr op til omkring 6 mm. Giv nyklækkede fårekyllinger, flyveløse bananfluer, springhaler, små bænkebidere, bladlus, små kakerlaknymfer, rismelbillelarver og termitter.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Slægtens frøer er dagaktive. Hannerne kalder for at forsvare territorier og tiltrække hunner, og de kan brydes med hinanden. Artens egen adfærd er ikke dokumenteret.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Madagaskar.