herpy

FRØER

Black-eared Mantella

Mantella milotympanum

Mantella milotympanum er en af slægtens mindste frøer, under 23 mm, fra nogle få sumpskove i det øst-centrale Madagaskar. Den er ensfarvet rød til orangerød med en sort plet over hver trommehinde. Arten er kritisk truet i naturen og holdes som de nære slægtninge: køligt og fugtigt.

Familie: Mantellidae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**18-23 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**4-8 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov, bjergskov og vådområde**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 30 cm** L × B × H til 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-23 °C**
Temperatur, nat	**16-18 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**I gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**På jorden**
Kønsmoden	**12-14 mdr.**
Æg pr. lægning	**12-30**
Klækning	**2-12 dage**
Larvetid	**42-98 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Kritisk truet (CR)**

Står på CITES liste II (hele slægten Mantella), så handel over landegrænser kræver CITES-papirer, og sælgeren skal kunne dokumentere, at dyrene er lovligt opdrættet. Arten er kritisk truet på IUCN's rødliste, så vælg kun opdræt. EU-bilaget er ikke aflæst for frøer og er derfor udeladt.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Mantella milotympanum*.
TEMPERATUR	Om dagen skal der være 20-23 °C, og om natten 16-18 °C. Arten skal holdes køligt: undgå temperaturer over 26 °C, for de giver varmestress, og længere perioder med varme giver sygdom og kan slå dyrene ihjel.
LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING	Luftfugtigheden skal være 70-100 %. Forstøv terrariet dagligt med regnvand, osmosevand eller postevand behandlet mod klor og tungmetaller, kraftigt i varmt vejr og mindre, når det er køligt.
VAND OG VANDKVALITET	Der skal altid stå en lav vandskål i terrariet. Mantellaer er dårlige svømmere, så skålen skal være så lav, at frøerne let kommer op, og den må ikke fylde meget af bunden. Dybden er ikke dokumenteret for arten selv.
LYS OG UVB	Et behov for UVB er ikke dokumenteret. Et svagt UVB-lys i Ferguson-zone 1 er formentlig en fordel, når der er skygge og planter, så dyrene kan vælge. Lyset skal ikke give varme. Hav lyset tændt 10-12 timer om dagen.
FODER	*Mantella milotympanum* er insektæder og kan, som resten af slægten, tage forholdsvis store byttedyr op til omkring 6 mm.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Mantella milotympanum* er dagaktiv og dristig for en så lille frø. Den jager og patruljerer i territoriet det meste af dagen.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Madagaskar.