herpy

FRØER

Guibé's Mantella

Mantella nigricans

Mantella nigricans er en lille, dagaktiv frø fra skovene langs vandløb i det nordlige og nordøstlige Madagaskar. Den bliver op til 28 mm og er tegnet i grønt, brunt og sort med sort bug og blå pletter. Arten er nært beslægtet med *Mantella baroni*, holdes som den og tåler et bredere temperaturspænd end mange af slægtens arter.

Familie: Mantellidae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**27-28 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Begynder**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 30 cm** L × B × H til 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-24 °C**
Temperatur, nat	**16-18 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**I gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**På jorden**
Kønsmoden	**12-18 mdr.**
Æg pr. lægning	**50-130**
Klækning	**3-12 dage**
Larvetid	**42-56 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Står på CITES liste II (hele slægten Mantella), så handel over landegrænser kræver CITES-papirer, og sælgeren skal kunne dokumentere, at dyrene er lovligt opdrættet eller indført. EU-bilaget er ikke aflæst for frøer og er derfor udeladt.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Der findes kun lidt viden om pasningen af *Mantella nigricans*, som kun sjældent holdes. Den passes som den nære slægtning *Mantella baroni*, og terriemål, kuld, larvetid, kønsmodenhed og levetid er lånt derfra.

TEMPERATUR

Om dagen skal der være 21-24 °C og om natten 16-18 °C. Arten klarer sig godt i et bredere spænd end mange af slægtens arter, og 19-26 °C er i orden, men længere tid over 26 °C skal undgås.

LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING

Arten lever langs vandløb i regnskov og skal have mere fugt end *Mantella baroni* og de arter, der kommer fra tørre egne: 70-100 % hele året.

VAND OG VANDKVALITET

Stil en lav vandskål i terrariet, og lad den altid være fyldt. Frøerne er dårlige svømmere, så skålen skal være så lav, at de let kan komme op, og den må ikke fylde meget af bunden.

LYS OG UVB

Der er ikke dokumenteret noget behov for UVB hos arten. Et svagt UVB-lys (Ferguson-zone 1) er valgfrit og er formentlig en fordel, når der er skygge og planter, så dyrene kan vælge. Lys til planterne skal ikke give varme.

FODER

Mantella nigricans er en ivrig jæger og foretrækker fårekyllinger og store bananfluer (*Drosophila hydei*) frem for små bananfluer og springhaler. I naturen består føden hovedsagelig af myrer, mider og andre små leddyr.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Mantella nigricans er dagaktiv og lever mest på jorden nær rindende vand. Dyrene er ret tilbagetrukne, og hannerne kalder ofte halvt skjult under visne blade.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Madagaskar.