herpy

FRØER

Green Mantella

Mantella viridis

Mantella viridis er en lille, dagaktiv frø på 2-3 cm med skarp grøn farve, sort ansigtsmaske og blå-hvidt marmoreret bug. Den lever kun i det yderste nord af Madagaskar, tåler varme dårligt og er truet i naturen, så kun opdrættede dyr bør komme på tale.

Familie: Mantellidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**2-3 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-8 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Tørskov og vådområde**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Begynder**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 30 cm** L × B × H til 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Temperatur, nat	**17-20 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**I gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**På jorden**
Æg pr. lægning	**40-115**
Larvetid	**42-56 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Truet (EN)**

Står på CITES liste II (hele slægten Mantella), så handel over landegrænser kræver CITES-papirer. Køb kun dyr med dokumentation for, at de er lovligt opdrættet eller indført.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Indretningen kan være enkel. Gulvareal betyder mere end højde, fordi *M. viridis* næsten kun lever på jorden. Et terrarie på 45 × 45 × 30 cm er nok til fire dyr, og et bredere, fx 90 × 45 × 30 cm, rummer en gruppe på otte til ti.

TEMPERATUR

Om dagen holdes terrariet på 20-24 °C med et fald til 17-20 °C om natten. Over 27 °C stresses *M. viridis* hurtigt, og i slægten kan temperaturer over 27 °C hurtigt blive dødelige, især for unge dyr.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING

Luftfugtigheden holdes på 60-70 % til daglig og op til 80 % i yngletiden, med mere fugt nede ved bunden og i mosset. Arten tåler et ret bredt spænd, så længe der altid står rent vand frem.

VAND OG VANDKVALITET

Der skal altid være en lav vandskål eller et lavt vandparti, så frøerne ikke tørrer ud ved lavere luftfugtighed. Vandet skal være så lavt, at små dyr nemt kommer op, og dybden er ikke dokumenteret.

LYS OG UVB

Lys er først og fremmest til planterne. Der er ikke dokumentation for, at *M. viridis* har brug for UVB, men fordi arten er aktiv i delvist sol i naturen, er et svagt UVB-rør formentlig en fordel.

FODER

M. viridis er en lille insektæder, der tager små byttedyr.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

M. viridis er dagaktiv og bedst som gruppe. Uden for yngletiden er dyrene så godt som passive over for hinanden, men voksne hunner kan slås i yngletiden. Et stort terrarie med mange synsbarrierer dæmper det.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Madagaskar.