herpy

FRØER

Cinnamon Frog

Nyctixalus pictus

Nyctixalus pictus er en lille, nataktiv træfrø fra regnskovene på Borneo og Palawan. Den er kanelbrun til rødbrun med små hvide til gule pletter og bliver 3-4 cm. Arten yngler i vandfyldte hulrum, har ingen fast yngletid og avles forholdsvis nemt i et terrarie med et lille vandparti.

Familie: Rhacophoridae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**3-4 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**3-6 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift	**Ingen kendt**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H til 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Temperatur, nat	**20-23 °C**
Luftfugtighed	**80-100 %**
Vand	**Vanddel** dybde 5-8 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**På blade over vand**
Kønsmoden	**8-12 mdr.**
Æg pr. lægning	**3-10**
Klækning	**14 dage**
Larvetid	**50 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står ikke på CITES-listerne, så der kræves ingen CITES-papirer. EU-bilaget er ikke aflæst i tabellen og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et terrarie på 45 × 45 × 45 cm er nok til tre voksne dyr, men et større, rigt beplantet paludarium er det bedste hjem.
TEMPERATUR	Hold terrariet på 24-27 °C om dagen, og lad det falde til 20-23 °C om natten. Arten tåler et nattefald på op til 10 °C, så almindelig stuetemperatur om natten er fin.
LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING	Luftfugtigheden skal være meget høj, 80-100 %. Forstøv terrariet hver dag, helst sidst på dagen lige før eller efter, at lyset slukkes, med afkloreret postevand, regnvand eller osmosevand.
VAND OG VANDKVALITET	Terrariet skal have et fast vandparti på 5-8 cm dybde, som tager en god del af bunden. Vandet skal være rent og afkloreret og have samme temperatur som luften.
LYS OG UVB	Arten er nataktiv, og UVB er valgfrit. Et svagt UVB-rør med skyggefulde steder at trække sig tilbage til er et godt valg: det giver lidt varme og hjælper med døgnrytmen.
FODER	*Nyctixalus pictus* æder levende insekter. Voksne dyr tager små fårekyllinger og andre foderinsekter i passende størrelse, og unge frøer tager fårekyllinger på omkring 6 mm.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er nataktiv og sky. Om dagen sidder den skjult mellem bladene, og om natten er den aktiv på grene og blade. Hannerne kalder. Et par eller en lille gruppe kan holdes sammen i et rummeligt terrarie med mange siddepladser.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Brunei, Indonesien, Malaysia og Filippinerne.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/froer/nyctixalus-pictus