herpy

FRØER

Cuban Treefrog

Osteopilus septentrionalis

Osteopilus septentrionalis er en stor, hårdfør løvfrø fra Cuba, Bahamas og Caymanøerne. Hunnerne bliver op til 13 cm, huden kan skifte farve efter omgivelserne, og de lange tæer med store hæfteskiver gør den til en dygtig klatrer. Den er nem at holde, men støjende, glubsk og med et hudsekret, der kan irritere øjne og slimhinder.

Familie: Hylidae Udgivet 16. november 2026 **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**5-13 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-13 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Tørskov, regnskov og vådområde**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Begynder**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**60-90 %**
Vand	**Vandskål** dybde 2-3 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**I vand**
Kønsmoden	**4-8 mdr.**
Æg pr. lægning	**75-1.000**
Klækning	**1-2 dage**
Larvetid	**21-30 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og andre haletudser**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført under CITES, så der kræves ingen CITES-papirer. IUCN vurderer den som ikke truet (LC). Regler om indførsel, hold og salg kan afvige mellem lande, så tjek de gældende regler, inden dyret købes eller flyttes.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et terrarie på 45 × 45 × 60 cm er minimum til 2 voksne *Osteopilus septentrionalis*. Frøen er aktiv og klatrer meget, så højden betyder mere end gulvarealet, og større er bedre, især til flere dyr.

TEMPERATUR
Om dagen holdes *Osteopilus septentrionalis* ved 24-29 °C med en let gradient, så frøen kan vælge varmere eller køligere sted. Den tåler store udsving, men vedvarende varme over ca. 30 °C giver stress og udtørring.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING
Luftfugtigheden skal ligge på 60-90 % med en tydelig rytme. Basisfugten kan være ca. 60 %, og sprøjt kraftigt med afkloreret eller osmosevand mindst en gang dagligt, helst om aftenen, så den stiger til 80-90 %.

VAND OG VANDKVALITET
Stil en stor, lav vandskål frem, hvor *Osteopilus septentrionalis* kan sidde med det meste af kroppen under vand, 2-3 cm dyb, så frøen kan komme op uden at kæmpe.

LYS OG UVB
Der er ingen dokumentation for, at *Osteopilus septentrionalis* har brug for UVB, men svagt UVB giver en tydelig dagsrytme og kan fremme appetit og aktivitet. Det er derfor valgfrit.

FODER
Osteopilus septentrionalis er et glubsk rovdyr, der æder alt i passende størrelse. Giv varierede insekter: fårekyllinger, græshopper, kakerlakker, bananfluer, mel- og voksorme, silkeorme og små regnorme.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Osteopilus septentrionalis er en natlig og sky frø, der sover i et skjul om dagen. Hannerne kalder højt om natten med et skurrende, gøende skrig, der kan høres langt væk og ligner en lille hund.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Cuba, Bahamas og Caymanøerne.