herpy

FRØER

Red-legged Kassina

Phlyctimantis maculatus

Phlyctimantis maculatus er en slank, nataktiv frø fra Østafrika og det nordøstlige Sydafrika med gråbrun, mørkplettet ryg og knaldrøde felter på indersiden af bagbenene. Den går og løber hellere end at hoppe, klatrer i grene om natten og graver sig ned om dagen. Arten er hårdfør og kan holdes i par eller små grupper, men haletudserne er usædvanligt længe om at blive til frøer.

Familie: Hyperoliidae Tidligere navn: *Kassina maculata; Hylambates maculatus* Udgivet 15. november 2026 **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**6-8 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende, jordboende og gravende**
Biotop	**Savanne og vådområde**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**75 × 60 × 60 cm** L × B × H til 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-27 °C**
Temperatur, nat	**20-23 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Vanddel** dybde 5 cm
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Ægglægning	**I vand**
Æg pr. lægning	**300**
Lægninger pr. år	**2-3**
Klækning	**3-5 dage** ved 24 °C
Larvetid	**150-300 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Ikke opført på CITES ifølge opslagstabellen, så der kræves ingen CITES-papirer. EU-bilaget er ikke aflæst for frøer og er derfor udeladt.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Angivelserne for et par eller en trio svinger fra 60 × 45 × 60 cm til 60 × 75 × 60 cm, og et terrarie med stort bundareal er at foretrække: *Phlyctimantis maculatus* lever mest på jorden, men klatrer gerne op til omkring 50 cm.

TEMPERATUR
Om dagen holdes terrariet på 22-27 °C med en varm ende omkring 26 °C og en køligere ende omkring 20-22 °C, og om natten 20-23 °C.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING
Luftfugtigheden ligger om dagen på 60-70 % og må gerne stige til 70-80 % om natten. Sprøjt hver aften med lunkent vand, gerne med et tidsstyret sprøjteanlæg, så fugten stiger, når lyset slukkes.

VAND OG VANDKVALITET
Terrariet skal have et vandparti, der dækker omkring en fjerdedel af bunden, med omkring 5 cm vand og lave kanter eller en gren, så frøerne nemt kommer op igen.

LYS OG UVB
Om UVB er nødvendigt, er der ikke enighed om, men det anbefales, fordi D3 i pulverform alene ikke er en sikker løsning.

FODER
P. maculatus æder insekter og i naturen også mindre frøer. I terrariet bruges fårekyllinger, græshopper, fluer, møl og kalkorme, og foderdyrene må højst være så store som afstanden mellem frøens øjne.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
P. maculatus er sky og ligger det meste af dagen skjult eller nedgravet. Om natten bliver den aktiv, klatrer og går på jagt. Hannerne kalder med et højt, kort kvæk, der gentages med mellemrum.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambique, Zimbabwe, Sydafrika og Eswatini.