herpy

FRØER

Red-banded Rubber Frog

Phrynomantis bifasciatus

Phrynomantis bifasciatus er en kompakt, glat og skinnende frø fra det sydlige og østlige Afrika. Den er sort med skarpe røde til cremefarvede bånd, går mere, end den hopper, og æder helst myrer og andre små leddyr. Hudsekretet er giftigt for andre frøer, så arten må ikke holdes sammen med andre arter.

Familie: Microhylidae Tidligere navn: *Phrynomerus bifasciatus* **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**4-7 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**8-10 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Savanne**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 30 × 30 cm** L × B × H til 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Temperatur, nat	**20-23 °C**
Luftfugtighed	**50-70 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Enkeltvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**I vand**
Æg pr. lægning	**300-1.500**
Klækning	**4 dage**
Larvetid	**30-90 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Ikke opført på CITES ifølge opslagstabellen, så der kræves ingen CITES-papirer. EU-bilaget er ikke aflæst for frøer og er derfor udeladt.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Der findes kun lidt viden om pasningen af *Phrynomantis bifasciatus*, og anbefalingerne bygger på artens levested og på de få erfaringer, der er.

TEMPERATUR

Om dagen skal der være 24-29 °C, og om natten 20-23 °C. Arten kommer fra varmt, halvtørt land og trives bedst i den varme ende af spændet. Nattemperaturen er ikke kendt for arten; 20-23 °C passer til klimaet i udbredelsesområdet.

LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING

Luftfugtigheden skal være 50-70 %. Arten kommer fra tørt til fugtigt savanneland og er mere tørketålende end de fleste frøer, men den kan stadig tørre ud.

VAND OG VANDKVALITET

Stil en stor, lav skål med rent vand i terrariet, så stor, at frøen kan ligge i den, og så lav, at den nemt kommer op igen. Padder optager vand og stoffer gennem huden, så vandet skal være uden klor og kloramin.

LYS OG UVB

Phrynomantis bifasciatus har ingen kendt brug for UVB, men svagt UVB kan gives og gavner planterne. Almindeligt terrarielys i 10-12 timer om dagen giver en tydelig døgnrytme.

FODER

Phrynomantis bifasciatus har en lille mund og tager helst små byttedyr. I naturen består kosten mest af myrer og termitter, men også andre små leddyr som græshopper og edderkopper.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Phrynomantis bifasciatus er en rolig frø, der går og løber mere, end den hopper. Den er mest aktiv om aftenen og natten og gemmer sig om dagen. Truet pumper den sig op og viser de røde bånd.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Congo-Kinshasa, Etiopien, Somalia, Kenya, Tanzania, Mozambique, Zimbabwe, Zambia, Malawi, Botswana, Namibia, Angola, Sydafrika og Eswatini.