herpy

FRØER

Giant Monkey Frog

Phyllomedusa bicolor

Phyllomedusa bicolor er en af verdens største træfrøer: en rolig, voksbelagt klatrer fra Amazonas, der går langsomt på grene i stedet for at hoppe. Den er nataktiv, lever af insekter og kræver et højt, luftigt terrarie med moderat fugt, ikke den våde regnskovsluft, som de fleste andre træfrøer får.

Familie: Phyllomedusidae Udgivet 16. november 2026 **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**9-12 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Øvet**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**På blade over vand**
Æg pr. lægning	**600**
Klækning	**7-14 dage** ved 24 °C
Larvetid	**80-100 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-27 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**50-70 %**
Vand	**Vandskål** dybde 2-4 cm
UVB	**Valgfri**
Kost	**Insekter**
Holdes	**Parvis eller 1 han med flere hunner**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES-listerne, så der kræves ingen CITES-papirer. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Frøen bruger højden og skal have et højt, godt ventileret terrarie. Til to voksne dyr, en han og en hun, er 45 × 45 × 60 cm (længde × bredde × højde) minimum, og højere er bedre.

TEMPERATUR

Om dagen skal der være 22-27 °C i terrariet, og omkring 24 °C er ideelt. Om natten må temperaturen falde til 18-22 °C, og et fald på nogle grader gør godt.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING

Luftfugtigheden skal være moderat og ikke tropisk vådt. Voksne dyr trives ved 50-60 %, og 40-70 % tåles. Under 40 % er der risiko for udtørring, og over 70 % i længere tid kan give luftvejsinfektioner.

VAND OG VANDKVALITET

Stil en stor, men lav vandskål på bunden, så frøen kan lægge sig og suge vand. Vanddybden skal være 2-4 cm og aldrig så dyb, at en lille frø ikke kan sidde med hoved og overkrop over vand.

LYS OG UVB

Planterne og dagsrytmen er det vigtigste. Brug et LED-lys eller et rør, der egner sig til planter, 12 timer om dagen og mørke om natten. Frøen er nataktiv, men sidder ofte åbent om dagen og tåler lys langt bedre end andre træfrøer.

FODER

Frøen er en nataktiv jæger, der ligger på lur og tager levende insekter, som bevæger sig. Voksne dyr får fårekyllinger i passende størrelse (3-5 uger gamle), dubia-kakerlakker, silkeorme, hornorme og voksmøllarver.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

P. bicolor er en rolig frø, der kan sidde stille i timevis, og den bliver sjældent stresset af dagslys.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Brasilien, Colombia, Bolivia, Peru, Venezuela, Guyana, Surinam og Fransk Guyana.