herpy

FRØER

Waxy Monkey Tree Frog

Phyllomedusa sauvagii

Phyllomedusa sauvagii er en stor, rolig løvfrø fra Gran Chaco og de tilstødende skove i Sydamerika. Den smører selv et vandtæt, voksagtigt lag ud over huden og kræver derfor et varmere og tørrere terrarie end de fleste andre løvfrøer. Hudsekretet er biologisk aktivt, så vask hænder efter kontakt.

Familie: Phyllomedusidae Udgivet 15. november 2026 **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**7-10 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Savanne og tørskov**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Hotspot	**29-32 °C**
Temperatur, nat	**18-21 °C**
Luftfugtighed	**50-75 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Vinterhvile	**18 °C** 4-6 uger
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**På blade over vand**
Kønsmoden	**12-18 mdr.**
Æg pr. lægning	**200-800**
Klækning	**5-9 dage**
Larvetid	**28-42 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står ikke på CITES-listerne, så der kræves ingen CITES-papirer. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Phyllomedusa sauvagii er trælevende og har brug for højde og mange grene. Til op til to dyr er 45 × 45 × 60 cm nok; til 3-4 dyr 45 × 45 × 90 cm, til 4-5 dyr 60 × 45 × 90 cm og til 5-8 dyr 90 × 45 × 90 cm.

TEMPERATUR

Hold 24-29 °C om dagen med et varmested på 29-32 °C i toppen og et fald til 18-21 °C om natten. Angivelserne svinger: nogle holder terrariet på 27-28 °C om dagen og 24 °C om natten.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING

Luftfugtigheden skal ligge på 50-60 % om dagen og stige til 70-75 % morgen og aften, når terrariet er sprøjtet. Det er tørt for en løvfrø og en vigtig forskel fra fx *Agalychnis callidryas*.

VAND OG VANDKVALITET

Stil en stabil vandskål med glatte sten eller en skrå kant, så frøen let kommer op, og skift vandet hver dag. Frøen optager vand gennem huden og sidder gerne i skålen. I et regnkammer til avl bruges en vanddel på 5-15 cm.

LYS OG UVB

Giv 12 timers lys om dagen og mørke om natten, og brug plantelys, hvis terrariet er beplantet.

FODER

Phyllomedusa sauvagii æder insekter: fårekyllinger, kakerlakker, møl, fluer og voksmøllarver. Foderdyret må højst være så bredt som frøens hoved. Mange frøer afviser ormeagtigt foder.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Phyllomedusa sauvagii er rolig og langsom og går i stedet for at hoppe. Den er aktiv i skumringen og om natten, men vænner sig til at blive aktiv, når der kommer foderdyr i terrariet.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Argentina, Bolivia, Paraguay og Brasilien.