herpy

FRØER

White-lined Leaf Frog

Phyllomedusa vaillantii

Phyllomedusa vaillantii er en nataktiv bladfrø fra Amazonas, 5-8 cm lang, med grøn ryg, rødbrune flanker og røde, lavendelfarvede eller orange farver på lårenes inderside. Den går langsomt på tværs af grene i stedet for at hoppe og lægger sine æg i en foldet bladrede over vand.

Familie: Phyllomedusidae Udgivet 16. november 2026 **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**5-8 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**8-10 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov og vådområde**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 90 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Temperatur, nat	**20-24 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Vandskål** dybde 2-5 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**På blade over vand**
Kønsmoden	**12-18 mdr.**
Æg pr. lægning	**200-800**
Klækning	**5-14 dage** ved 24 °C
Larvetid	**40-90 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står ikke på CITES-listerne, så der kræves ingen CITES-papirer. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et højt, godt ventileret terrarie passer bedst, fordi frøen er et trædyr. Minimum er 45 × 45 × 90 cm til to voksne dyr, og en lidt større flade giver mere ro, hvis dyrene holdes i en lille gruppe.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen holdes på 24-28 °C. Om natten må den gerne falde 3-6 grader, til 20-24 °C, som i naturen. Der er ikke brug for en hotspot-lampe, hvis rummet er varmt nok.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden skal ligge mellem 60 og 80 % med naturlige udsving gennem dagen. Sprøjt terrariet en eller to gange dagligt, helst om aftenen, så det kan tørre lidt op i løbet af dagen.
VAND OG VANDKVALITET	Frøen sidder gerne i en vandskål om natten, og skålen skal derfor være stor nok til, at dyret kan sidde i vandet, og lav nok til, at det aldrig risikerer at drukne: 2-5 cm dyb med en sten eller en gren som udgang.
LYS OG UVB	Giv 10-12 timers lys om dagen på en timer, og slå lyset fra om natten. Belysning til planterne er nok, og frøen sover om dagen under bladene, så der skal altid være skygge.
FODER	Frøen æder levende insekter, der fanges om natten: fårekyllinger, fluer, kakerlakker og voksmøl. Voksne dyr får 2-8 foderdyr pr. frø, ca. hver anden til femte dag. Foderdyrene skal være mindre end afstanden mellem frøens øjne.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er rolig og natlig, og den sover hele dagen på et blad med benene trukket ind. Om natten bliver den aktiv, hvis den ikke forstyrres. Hannerne kalder om natten, især efter sprøjtning.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Bolivia, Brasilien, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Surinam og Venezuela.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/froer/phyllomedusa-vaillantii