herpy

FRØER

Four-lined Tree Frog

Polypedates leucomystax

Polypedates leucomystax er en slank, nataktiv træfrø på 4-9 cm fra Sydøstasien, som lægger æggene i en skumrede ved vandet. Den er tilpasningsdygtig, lever gerne tæt på mennesker og er nem at holde, men tåler ikke varme over 29 °C. Ynglen sættes i gang i et regnkammer.

Familie: Rhacophoridae Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**4-9 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**5 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Tørskov, regnskov og vådområde**
Hudgift	**Ingen kendt**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**23-27 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**60-70 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**I en skumrede**
Æg pr. lægning	**100-400**
Klækning	**3-4 dage**
Larvetid	**49-70 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står ikke på CITES-listerne, så der kræves ingen CITES-papirer. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET

To voksne *P. leucomystax* kan holdes i et glasterrarie på 45 × 45 × 60 cm, der rækker til 2-4 dyr. Et mindre terrarie på 60 × 30 × 40 cm kan huse tre dyr, men arten springer langt og har gavn af mere plads.

TEMPERATUR

Hold terrariet på 23-27 °C om dagen og 18-22 °C om natten.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING

Hold luftfugtigheden på 60-70 %. Det klares med håndsprøjte, tågeanlæg eller regnanlæg, flere gange om dagen efter behov.

VAND OG VANDKVALITET

P. leucomystax skal altid have adgang til rent vand i en stor, lav skål, som er let at gøre ren, og som frøen let kan komme op af.

LYS OG UVB

Arten har ikke brug for andet lys end det, planterne kræver. Der er ingen dokumentation for, at den har brug for UVB, men en svag UVB-kilde kan bruges til planterne og virker desuden bakteriehæmmende.

FODER

P. leucomystax er insektæder, og fårekyllinger kan være basisfoderet, suppleret flere gange om måneden med voksmøllarver, silkeorme, møl, fluer, små regnorme og små kakerlakker.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

P. leucomystax er nataktiv og sidder om dagen skjult mellem planter og grene, men snupper gerne et foderdyr, der kommer forbi. Den springer langt og klatrer godt, men glider ikke i luften som nogle af slægtningene i familien.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Brunei, Indonesien, Malaysia, Filippinerne, Singapore og Thailand.