herpy

FRØER

African Bullfrog

Pyxicephalus adspersus

Pyxicephalus adspersus er en af verdens største frøer: en tung, olivengrøn gravefrø fra det sydlige og østlige Afrika, hvor hannerne kan blive 25 cm og vogter deres haletudser. Den æder næsten alt, hvad den kan overmande, bider hårdt og kan leve 20-30 år i terrariet. Den passer til holderen, der vil have et stort, markant dyr og har respekt for munden.

Familie: Pyxicephalidae Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**9-25 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**15-30 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Halvørken, savanne og vådområde**
Hudgift	**Ingen kendt**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Hotspot	**29-32 °C**
Temperatur, nat	**20-24 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Vanddel**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**I vand**
Æg pr. lægning	**3.000-4.000**
Klækning	**2-3 dage** ved 24-27 °C
Larvetid	**14-35 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter, færdigfoder og andre haletudser**
Yngelpleje	**Vogter æggene**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Ikke opført på CITES ifølge opslagstabellen, så der kræves ingen CITES-papirer. EU-bilaget er ikke aflæst for frøer og er derfor udeladt. Dyr i handlen er som regel opdrættet i fangenskab.

Pasning i korte træk

TERRARIET
En voksen han skal have et terrarie på mindst 90 × 45 × 45 cm, mens hunner og ungdyr kan nøjes med lidt mindre. Bundarealet er vigtigere end højden, for arten klatrer ikke.

TEMPERATUR
Om dagen skal terrariet ligge på 24-28 °C med en varm side på 29-32 °C, og om natten må det falde til 20-24 °C. Den kølige side må gerne være lidt over stuetemperatur, så dyret selv kan vælge.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING
Luftfugtigheden holdes på 60-80 %. Den kommer mest fra den fugtige bund og vanddelen, og hele terrariet kan sprøjtes med afkloreret vand efter behov.

VAND OG VANDKVALITET
Frøen bader og svømmer gerne og skal altid have adgang til vand. En fast vanddel eller et stort, fladt kar, hvor hele dyret kan ligge med vand op til hagen og nemt komme op igen, er det mindste.

LYS OG UVB
Arten er mest aktiv i skumringen og om natten og behøver ikke stærkt lys, men den skal have en tydelig forskel på dag og nat: 12-13 timers lys om sommeren og omkring 11 timer om vinteren.

FODER
Pyxicephalus adspersus er et rovdyr og æder næsten alt, der kan komme ned i munden: insekter, orme, snegle og i naturen også gnavere, krybdyr, fugle og andre frøer.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Dyret ligger tit nedgravet med kun øjne og næsebor over bunden og venter på bytte, men kommer frem om natten for at jage og svømme. Det er ikke et dyr til at håndtere: stress er usundt, og bidet er hårdt.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Angola, Botswana, Kenya, Malawi, Mozambique, Namibia, Sydafrika, Tanzania, Uganda, Zambia og Zimbabwe.