herpy

FRØER

Edible Bullfrog

Pyxicephalus edulis

Pyxicephalus edulis er en kraftig, bredmundet gravefrø fra Afrikas savanner og oversvømmede græsland: mindre end *Pyxicephalus adspersus*, men med samme appetit, samme tandlignende kæbeudløb og et bid, der skal tages alvorligt. Den tilbringer det meste af tiden nedgravet, er robust og kan holdes i et forholdsvis lille terrarie.

Familie: Pyxicephalidae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**8-12 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Savanne og vådområde**
Hudgift	**Ingen kendt**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 45 × 30 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**23-26 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**50-70 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**I vand**
Æg pr. lægning	**3.000-4.000**
Klækning	**2-3 dage** ved 24-27 °C
Larvetid	**14-35 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Vogter æggene**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Ikke opført på CITES ifølge opslagstabellen, så der kræves ingen CITES-papirer. EU-bilaget er ikke aflæst for frøer og er derfor udeladt.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Der findes kun lidt viden om pasningen af *Pyxicephalus edulis*, og det meste, der skrives om bullfrøer, handler om den større *Pyxicephalus adspersus*.

TEMPERATUR
Om dagen skal terrariet holde 23-26 °C og om natten 18-22 °C. Temperaturen skal ligge jævnt og må ikke komme over 28 °C i længere tid: allerede ved en stigning fra 25 til 30 °C stiger stresshormonerne, og dyrene taber sig.

LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING
Luftfugtigheden skal være 50-70 %. Den kommer fra den fugtige bund og vandkarret, og terrariet forstøves dagligt med vand uden klor, så bunden holder sig let fugtig. Et digitalt hygrometer viser, om niveauet holder.

VAND OG VANDKVALITET
Frøen skal altid have adgang til et stort, fladt kar, hvor hele dyret kan ligge og bade. Karret skal være let at komme ind i og ud af, og vandet skal være lavt: kun få centimeter dybt, så dyret kan hvile med næsen over vandet.

LYS OG UVB
Arten er mest aktiv i skumringen og om natten og behøver ikke kraftigt lys.

FODER
Pyxicephalus edulis er et rovdyr, der æder næsten alt, som det kan overmande. I naturen består føden især af biller og græshopper, desuden termitter, tusindben, myrer og edderkopper.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Dyret ligger næsten altid nedgravet med kun øjne og næsebor over bunden og venter på bytte. Det er mest aktivt i skumringen og om natten og kommer frem for at jage og svømme.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Benin, Nigeria, Tchad, Cameroun, Angola, Zambia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambique, Zimbabwe, Botswana og Sydafrika.