herpy

FRØER

Red-eyed Green Treefrog

Ranoidea chloris

Ranoidea chloris er en smuk, kraftigt grøn træfrø på 5-7 cm fra regnskove og fugtig skov langs Australiens østkyst. Den har gul bug, lilla lår og røde øjne og lever højt oppe i trækronerne, så den kun sjældent ses uden for yngletiden. Der findes kun lidt viden om pasningen, så den bygger på beslægtede australske træfrøer.

Familie: Pelodryadidae Tidligere navne: *Litoria chloris; Chlorohyla chloris* **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**5-7 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov og tempereret skov og eng**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Øvet**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**I vand**
Æg pr. lægning	**50-500**
Lægninger pr. år	**1-5**
Larvetid	**41-90 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-27 °C**
Temperatur, nat	**16-20 °C**
Luftfugtighed	**70-90 %**
Vand	**Vanddel** dybde 5-10 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller i gruppe**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står ikke på CITES-listerne. Australien tillader ikke indsamling og eksport af vilde dyr, så dyr i handlen er opdrættede. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Der findes kun lidt viden om pasningen af *Ranoidea chloris*. Anbefalingerne her bygger på klimaet i udbredelsesområdet og på erfaringerne med de beslægtede australske træfrøer *Ranoidea caerulea* og *Ranoidea splendida*.

TEMPERATUR
Om dagen skal temperaturen være 22-27 °C og om natten 16-20 °C. En kølig nat er naturlig, for udbredelsesområdet har køligere nætter end det nordlige Australien. Tallene er et skøn ud fra klimaet i udbredelsesområdet.

LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING
Luftfugtigheden skal være 70-90 %. Forstøv terrariet én gang om dagen, gerne om aftenen, når frøen vågner, og lad bunden tørre en smule op imellem. Et stort, fast vandparti holder på fugten, og så er forstøvning hver 3.-4. dag nok.

VAND OG VANDKVALITET
Ranoidea chloris yngler i lavt vand, så et fast vandparti eller en stor, lav vandskål passer til arten.

LYS OG UVB
Arten har brug for lys til planterne og en fast døgnrytme med 12-14 timers dag og mørke nætter. Lysstofrør eller LED varmer mindre end glødepærer.

FODER
Foderet er levende insekter: fårekyllinger, vandregræshopper, fluer, møl, dubiakakerlakker og et mindre antal melorme. Byttet må ikke være længere end afstanden mellem frøens øjne.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Arten er nataktiv og tilpasser sig fangenskab uden problemer. Den bliver ofte rolig med regelmæssig kontakt, men tåler dårligt megen håndtering, fordi huden er sart.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Australien.