herpy

FRØER

Black-webbed Treefrog

Rhacophorus kio

Rhacophorus kio er en stor, græsgrøn flyvefrø fra regnskovene i det sydlige Kina, Laos, Thailand og Vietnam. Hunnerne bliver op til 8 cm. Svømmehuden er orangegul med en sort plet ved roden af hver finger og tå, og frøen spænder den ud, når den glider mellem træerne. Arten er nataktiv og sky, og der findes kun lidt viden om pasningen i fangenskab.

Familie: Rhacophoridae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**6-8 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Hudgift	**Ingen kendt**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 45 × 90 cm** L × B × H til 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-24 °C**
Temperatur, nat	**18-21 °C**
Luftfugtighed	**70-90 %**
Vand	**Vandskål** dybde 2-3 cm
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**I en skumrede**
Æg pr. lægning	**130-180**
Klækning	**5 dage**
Larvetid	**45-85 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står ikke på CITES-listerne, så der kræves ingen CITES-papirer. EU-bilaget er ikke aflæst i tabellen og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Rhacophorus kio*. Anbefalingerne bygger på artens størrelse og levested og på den nært beslægtede *Rhacophorus reinwardtii*; tallene er lånt derfra og tilpasset, fordi *R. kio* er større.
TEMPERATUR	Hold terrariet på 21-24 °C om dagen, svarende til almindelig stuetemperatur, og lad det gerne falde til 18-21 °C om natten. Korte perioder op til 27-28 °C tåler frøen, men temperaturen må ikke komme over 28 °C.
LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING	Luftfugtigheden skal ligge på 70-90 %, lavest om dagen og højest om natten. Forstøv terrariet jævnligt med afkloreret postevand, regnvand eller osmosevand, og lad det tørre lidt op i løbet af dagen, så luften ikke står stille.
VAND OG VANDKVALITET	Stil en stabil, lav vandskål i terrariet, som frøen kan sidde i om natten. 2-3 cm vand er nok, så frøen let kommer op igen. Skift vandet, så snart det er snavset, og helst hver dag eller hver anden dag.
LYS OG UVB	Frøen er trælevende, og en svag UVB-kilde af den type, der bruges til tropiske skovdyr, anbefales. Et lavt UV-indeks på de øverste blade (Ferguson-zone 1) er et forsigtigt udgangspunkt.
FODER	*Rhacophorus kio* æder levende insekter. Fårekyllinger kan bruges hele livet, fra små nyklækkede til store, suppleret med små kakerlakker, soldaterfluelarver og en sjælden voksmøllarve som godbid.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er nataktiv og sky og tilbringer dagen skjult mellem bladene; det meste af tiden sidder den på glasset eller på inventaret.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Kina, Laos, Thailand og Vietnam.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/froeer/rhacophorus-kio