herpy

FRØER

Wallace's Flying Frog

Rhacophorus nigropalmatus

Rhacophorus nigropalmatus er en af de største flyvefrøer og lever højt oppe i regnskoven på Borneo, Sumatra og Malayahalvøen. Den er smaragdgrøn med sort svømmehud mellem fingre og tæer, og med sin udspilede svømmehud kan den glide op til 15 m mellem træerne. Hunnerne bliver op til 10 cm. Arten kræver et meget stort, højt og varmt terrarie, og der findes kun lidt viden om pasning og avl.

Familie: Rhacophoridae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**8-10 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift	**Ingen kendt**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 80 × 120 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Temperatur, nat	**21-23 °C**
Luftfugtighed	**70-90 %**
Vand	**Vanddel** dybde 10 cm
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**I en skumrede**
Æg pr. lægning	**800**
Larvetid	**42-85 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står ikke på CITES-listerne, så der kræves ingen CITES-papirer. EU-bilaget er ikke aflæst i tabellen og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Rhacophorus nigropalmatus*, og tallene her bygger på arten selv og på den nært beslægtede *Rhacophorus reinwardtii*, som er mindre.
TEMPERATUR	Hold terrariet på 24-28 °C om dagen og 21-23 °C om natten. Det svarer til lavlandsregnskoven, hvor arten lever, og temperaturen skal ikke komme over 30 °C.
LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING	Luftfugtigheden skal ligge på 70-90 %. Forstøv terrariet grundigt hver dag med afkloreret postevand, regnvand eller osmosevand, og lad det tørre lidt op i løbet af dagen.
VAND OG VANDKVALITET	Arten skal have et fast vandparti, som den kan sidde i og lægge æg over. Vandet skal være 10 cm dybt, og frøen skal let kunne komme op igen via grene, kork og sten.
LYS OG UVB	Frøen lever højt oppe i trækronerne, og en svag UVB-kilde af den type, der bruges til tropiske skovdyr, anbefales.
FODER	*Rhacophorus nigropalmatus* æder levende insekter.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er sky og nataktiv og tilbringer dagen skjult mellem bladene, ofte siddende tæt sammenkrøbet på en gren eller på glasset. Om natten bliver den aktiv, klatrer og glider.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Thailand, Myanmar (Burma), Malaysia, Indonesien og Brunei.