herpy

FRØER

Reinwardt's Flying Frog

Rhacophorus reinwardtii

Rhacophorus reinwardtii er en stor, nataktiv flyvefrø fra Javas skove. Den er jadegrøn med sort svømmehud mellem fingre og tæer, som den bruger til at glide fra træ til træ. Hunnerne bliver op til 8 cm, hannerne omkring 6 cm. Arten kræver et højt, luftigt terrarie og svale temperaturer, og der er kun lidt viden om avl i fangenskab.

Familie: Rhacophoridae Tidligere navn: *Hyla reinwardtii* Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**5-8 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Hudgift	**Ingen kendt**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H til 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-24 °C**
Temperatur, nat	**18-21 °C**
Luftfugtighed	**70-90 %**
Vand	**Vandskål** dybde 2-3 cm
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**I en skumrede**
Æg pr. lægning	**130-180**
Klækning	**5 dage**
Larvetid	**85 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står ikke på CITES-listerne, så der kræves ingen CITES-papirer. EU-bilaget er ikke aflæst i tabellen og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Terrariet skal være højt og luftigt. Til 3-4 opdrættede voksne er mindstemålet omkring 45 × 45 × 60 cm, og større er bedre for en frø, der glider.
TEMPERATUR	Hold terrariet på 21-24 °C om dagen, svarende til almindelig stuetemperatur, og lad det gerne falde til 18-21 °C om natten. Arten tåler korte perioder op til 27-28 °C, men er en bjergart, der foretrækker det køligt.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden skal ligge på 70-90 %. Terrariedyr klarer sig ved 60-80 %, mens luftfugtigheden i naturen er 82-100 %.
VAND OG VANDKVALITET	Stil en stabil, lav vandskål i terrariet, som frøen kan sidde i om natten. 2-3 cm vand er nok, så frøen let kommer op igen. Skift vandet, så snart det er snavset, og helst hver dag eller hver anden dag.
LYS OG UVB	Frøen er trælevende, og en svag UVB-kilde af den type, der bruges til tropiske skovdyr, anbefales. Det er ikke undersøgt, om arten har brug for den, så giv altid skyggefulde steder, frøen kan trække sig tilbage til.
FODER	*Rhacophorus reinwardtii* æder levende insekter. Fårekyllinger kan bruges hele livet, fra ca. 3 mm til unge dyr op til ca. 25 mm til voksne, suppleret med små kakerlakker, soldaterfluelarver og en sjælden voksmøllarve som godbid.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er nataktiv og sky og tilbringer dagen skjult mellem bladene; det meste af tiden sidder den på glasset eller på inventaret.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Indonesien.