herpy

FRØER

Red Rain Frog

Scaphiophryne gottlebei

Scaphiophryne gottlebei er en lille, rund og stærkt farvet frø fra sandstenskløfterne i Isalo på Madagaskar. Ryggen har skarpt afgrænsede felter i hvid, rødorange, grøn og sort. Frøen bliver 3-4 cm, graver sig ned i sand om dagen og klatrer på klippevægge om natten. Den er truet i naturen, og der findes kun lidt dokumenteret viden om pasningen.

Familie: Microhylidae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**3-4 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**2 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Klippeboende og gravende**
Biotop	**Tørskov og klippeterræn**
Hudgift	**Ingen kendt**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H til 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-25 °C**
Temperatur, nat	**17-20 °C**
Luftfugtighed	**65-85 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**I vand**
Kønsmoden	**12 mdr.**
Æg pr. lægning	**3-500**
Klækning	**3 dage**
Larvetid	**24-30 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Truet (EN)**

Arten står på CITES liste II. Handel over landegrænser kræver CITES-papirer, også for opdrættede dyr, og papirerne bør følge dyret ved køb og salg. Madagaskars eksportkvote for vildfangede dyr har siden 2014 været 0, så lovligt handlede dyr er opdræt; bed om dokumentation for oprindelsen.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt dokumenteret viden om pasningen af *Scaphiophryne gottlebei*.
TEMPERATUR	Om dagen skal der være 20-25 °C og om natten 17-20 °C, svarende til de køligere kløfter i udbredelsesområdet. Arten kræver ingen varmekilde og trives ved almindelig stuetemperatur.
LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING	Luftfugtigheden skal ligge på 65-85 %, men det vigtigste er, at bunden er fugtig i dybden, mens overfladen må tørre lidt mellem forstøvningerne.
VAND OG VANDKVALITET	Frøerne skal altid have en lav, ren vandskål på 1-2 cm, så de let kommer op igen. Skift vandet dagligt. Brug regnvand, osmosevand eller postevand, der er behandlet mod klor og chloramin.
LYS OG UVB	Lyset skal være dæmpet. Arten er nataktiv og lever i mørke kløfter, og der er ikke dokumenteret noget behov for UVB. Et svagt UVB-lys, svarende til Ferguson-zone 1, skader ikke og kan bruges, hvis terrariet har levende planter.
FODER	*Scaphiophryne gottlebei* æder alle slags små insekter og er grådig. Voksne tager fårekyllinger på omkring 6 mm, små dubia-kakerlakker, små melorme, fluelarver og lignende, og unger får fårekyllinger på omkring 3 mm og springhaler.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Scaphiophryne gottlebei* tilbringer dagen skjult i bunden eller i sprækker mellem sten og kork. Om natten kommer den frem og klatrer på klippevæggen.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Madagaskar.