herpy

FRØER

Marbled Rain Frog

Scaphiophryne marmorata

Scaphiophryne marmorata er en lille, buttet og grøn frø fra Madagaskars østlige regnskov. Hunnen bliver omkring 4 cm, hannen omkring 3 cm. Den graver sig ned i løvlaget om dagen, men klatrer også i buske og små træer på jagt efter insekter. Den er nem at holde, men yngler kun, når regntidens oversvømmelser efterlignes.

Familie: Microhylidae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**3-4 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-15 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende, jordboende og gravende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift	**Ingen kendt**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H til 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-26 °C**
Temperatur, nat	**18-21 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**I vand**
Kønsmoden	**10-12 mdr.**
Æg pr. lægning	**300-500**
Larvetid	**70 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Arten står på CITES liste II. Handel over landegrænser kræver CITES-papirer, også for opdrættede dyr, og papirerne bør følge dyret ved køb og salg. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og angives derfor ikke her.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Der findes kun lidt dokumenteret viden om pasningen af *Scaphiophryne marmorata*. Pasningen bygger på arten selv, hvor det er muligt, og ellers på den nært beslægtede *Scaphiophryne madagascariensis*.

TEMPERATUR
Om dagen skal der være 21-26 °C og om natten 18-21 °C. Arten kræver ingen varmekilde og trives ved almindelig stuetemperatur.

LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING
Luftfugtigheden skal ligge på 60-80 %, men det vigtigste er, at bunden er fugtig hele vejen igennem: når en håndfuld bund presses sammen, skal den klumpe og afgive et par dråber.

VAND OG VANDKVALITET
Frøerne skal altid have en lav, ren vandskål, 1-2 cm dyb, så de let kommer op igen. Skift vandet dagligt. Brug regnvand, osmosevand eller postevand, der er behandlet mod klor og chloramin.

LYS OG UVB
Lyset skal være dæmpet. Arten er nataktiv og skjuler sig om dagen, og der er ikke dokumenteret noget behov for UVB. Et svagt UVB-lys, svarende til Ferguson-zone 1, skader ikke og kan bruges, hvis terrariet har levende planter.

FODER
Scaphiophryne marmorata æder alle slags små insekter og er meget grådig. Voksne tager fårekyllinger på omkring 6 mm, små dubia-kakerlakker, små melorme, fluelarver og lignende, og unger får fårekyllinger på omkring 3 mm.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Scaphiophryne marmorata er genert og tilbringer det meste af dagen skjult i bunden eller under bark. Om natten kommer den frem, og den klatrer gerne rundt på grene.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Madagaskar.