herpy

FRØER

Hill Garden Bug-eyed Frog

Theloderma asperum

Theloderma asperum er en lille, nataktiv træfrø fra skovene i Sydøstasien. Den er sortbrun med hvide vorter, der ligner fugleklatter, og har dybt rubinrøde øjne. Arten tåler mere varme end de øvrige slægtsfæller og trives i et lille, fugtigt terrarie med en vanddel. Den kalder ret kraftigt og holdes bedst i en lille gruppe.

Familie: Rhacophoridae Tidligere navn: *Philautus asper*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**3-4 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende og semi-akvatisk**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Hudgift	**Ingen kendt**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H til 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Temperatur, nat	**17-21 °C**
Luftfugtighed	**75-95 %**
Vand	**Vanddel** dybde 5-10 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Ægglægning	**På blade over vand**
Kønsmoden	**6-10 mdr.**
Æg pr. lægning	**4-15**
Klækning	**7-14 dage**
Larvetid	**75-180 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står ikke på CITES-listerne, så der kræves ingen CITES-papirer. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og angives derfor ikke her. Køb opdrættede dyr, og bed om dokumentation for oprindelsen.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Theloderma asperum er lille og kan holdes i et forholdsvis kompakt terrarie. Et terrarie på 45 × 45 × 45 cm (længde × bredde × højde) er passende til en lille gruppe på fire dyr.

TEMPERATUR
Om dagen skal temperaturen være 20-24 °C, og om natten 17-21 °C. Arten tåler kortvarigt ned til omkring 10 °C og klarer 24-25 °C uden problemer, men over 27 °C bliver det farligt og kan være dødeligt.

LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING
Luftfugtigheden holdes på 75-95 %. Arten tåler korte perioder ned til omkring 50 %, hvis der er adgang til vand, men tør luft uden vand kan hurtigt være fatal.

VAND OG VANDKVALITET
Frøen opholder sig meget ved vandkanten og sidder endda under vand, så vanddelen er ikke til pynt. Giv et fast vandparti på 5-10 cm dybde med korkplader og korkrør, så både voksne og unger let kan komme op.

LYS OG UVB
Frøen er nataktiv og har ikke dokumenteret brug for UVB. Et svagt UVB-rør til skyggearter (Ferguson-zone 1) kan bruges og er valgfrit, men så skal frøerne altid kunne trække sig i skygge.

FODER
T. asperum æder insekter. Små fårekyllinger er det vigtigste foder, suppleret med voksmøllarver, fluer, springhaler til de mindste unger, små dubia-kakerlakker og soldaterfluelarver.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Theloderma asperum er nataktiv og sidder om dagen skjult i rør, mellem planter eller tæt på vandet.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Malaysia, Thailand, Myanmar (Burma), Indien, Bangladesh, Bhutan, Vietnam, Cambodja og Indonesien.