herpy

FRØER

## Chapa Bug-eyed Frog

# *Theloderma bicolor*

*Theloderma bicolor* er en lille, mosgrøn frø fra de fugtige bjergskove i det nordlige Vietnam og det sydlige Kina. Den er fladtrykt og dækket af knudrede vorter, så den næsten forsvinder mellem mos og lav. Arten er nataktiv og skal have et køligt, fugtigt terrarie med en vanddel, fordi den ikke tåler varme. Pasningen svarer til de øvrige mosfrøers, men flere avlstal er lånt fra slægtsfæller.

Familie: Rhacophoridae  Tidligere navn: *Rhacophorus leprosus bicolor; Rhacophorus bicolor*

### SPECIFIKATIONER

#### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **4-6 cm**<br>snude-kloak-længde |
| Levetid | **5-10 år** |
| Aktiv | **Nat** |
| Levevis | **Træboende** |
| Biotop | **Bjergskov og klippeterræn** |
| Hudgift | **Ingen kendt** |
| Sværhedsgrad | **Øvet** |

#### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **50 × 30 × 40 cm**<br>L × B × H til 4 voksne dyr |
| Temperatur, dag | **16-20 °C** |
| Temperatur, nat | **13-18 °C** |
| Luftfugtighed | **80-90 %** |
| Vand | **Vanddel**<br>dybde 5-10 cm |
| UVB | **Valgfri**<br>Ferguson-zone 1 |
| Kost | **Insekter** |
| Holdes | **Parvis eller i gruppe** |

#### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Æglæggende** |
| Udvikling | **Haletudser i vand** |
| Ægglægning | **På blade over vand** |
| Kønsmoden | **8-10 mdr.** |
| Æg pr. lægning | **3-25** |
| Klækning | **9-22 dage** |
| Larvetid | **75-180 dage**<br>fra klækning til metamorfose |
| Larvefoder | **Færdigfoder** |
| Yngelpleje | **Ingen** |

#### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ikke omfattet** |
| IUCN | **Ikke truet (LC)** |

Arten står ikke på CITES-listerne, så der kræves ingen CITES-papirer. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og angives derfor ikke her. Køb opdrættede dyr, og bed om dokumentation for oprindelsen.

## Pasning i korte træk

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Pasningen af *Theloderma bicolor* svarer til slægtsfællerne *Theloderma corticale* og *Theloderma asperum*, men arten skal holdes køligere. Den trives kun i et terrarie, hvor temperaturen kan holdes lav. |
| **TEMPERATUR** | Arten er en bjergfrø og tåler ikke varme. Om dagen skal der være 16-20 °C og om natten 13-18 °C, som passer til klimaet i højlandet. Kortvarigt tåler den ned til omkring 10 °C. |
| **LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING** | Luftfugtigheden skal være 80-90 %, og aldrig under 60 %. |
| **VAND OG VANDKVALITET** | Vanddelen er en fast del af terrariet. Giv 5-10 cm vand med korkplader og korkrør som land og skjul. |
| **LYS OG UVB** | Arten er nataktiv, så lyset er først og fremmest til planterne. Et lysstofrør på 6.500 K i 12 timer om dagen er nok til planter som pothos og fredslilje. |
| **FODER** | *Theloderma bicolor* æder levende insekter. Brug fårekyllinger som basis, suppleret med voksmøllarver, dubia-kakerlakker, fluer og soldaterfluelarver. Foderdyrene må højst være lige så lange som afstanden mellem frøens øjne. |
| **ADFÆRD OG HÅNDTERING** | *Theloderma bicolor* sidder om dagen skjult mellem planter og i kork og kommer frem, når det bliver mørkt. Dyrene kan holdes i par eller i en lille gruppe på tre til fire, når terrariet har plads og skjul nok. |
| **OPRINDELIG UDBREDELSE** | Vietnam og Kina. |