herpy

FRØER

Tonkin Bug-eyed Frog

Theloderma corticale

Theloderma corticale er en nataktiv, halvt vandlevende frø fra skovene i det nordlige Vietnam, Laos og Sydkina. Den knudrede, grøn- og sortplettede hud ligner mos og lav så godt, at frøen næsten forsvinder i terrariet. Den vil have køligt og vådt og tåler ikke varme, men er til gengæld let at få til at yngle.

Familie: Rhacophoridae Tidligere navn: *Rhacophorus corticalis* Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**6-9 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-20 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende og semi-akvatisk**
Biotop	**Regnskov, bjergskov og klippeterræn**
Hudgift	**Ingen kendt**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**80 × 50 × 40 cm** L × B × H til 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**18-23 °C**
Temperatur, nat	**15-20 °C**
Luftfugtighed	**80-90 %**
Vand	**Akvaterrarie** dybde 5-10 cm
Vandtemperatur	**17-22 °C**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Vinterhvile	**13-16 °C** 4-22 uger
Kost	**Insekter**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**På blade over vand**
Kønsmoden	**8-10 mdr.**
Æg pr. lægning	**6-47**
Klækning	**9-22 dage**
Larvetid	**75-180 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står ikke på CITES-listerne, så der kræves ingen CITES-papirer. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og angives derfor ikke her. Køb opdrættede dyr, og bed om dokumentation for oprindelsen.

Pasning i korte træk

TERRARIET	*Theloderma corticale* skal have et akvaterrarie, hvor en stor del af bunden, eller hele bunden, står under vand.
TEMPERATUR	Varme er artens største fjende. Det bedste er 16-23 °C, og ned til omkring 10 °C går fint, mens alt over 25 °C er et faresignal, og temperaturer over 27 °C kan slå frøerne ihjel.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden skal være høj: over 80 % og aldrig under 60 %, ellers kan frøerne tørre ud. Hunnerne lægger æg ved 80-90 %. Den store vandflade holder fugten oppe af sig selv, så frøerne skal ikke sprøjtes ret ofte.
VAND OG VANDKVALITET	Vanddelen er artens hjem. Vandet skal være 5-10 cm dybt, og dybere vand går også. Frøerne skal kunne sidde i vandet og nemt komme op på kork eller rødder.
LYS OG UVB	Frøen er nataktiv og har ikke dokumenteret brug for UVB. Et svagt UVB-rør til skyggearter (Ferguson-zone 1) kan bruges og giver det lille UV-indeks, der kan støtte døgnrytmen, men det er valgfrit.
FODER	*T. corticale* æder insekter: fårekyllinger med god mave, dubia-kakerlakker, voksmøllarver, soldaterfluelarver og små hornorme.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Theloderma corticale* er rolig og skjuler sig om dagen i rør, huler og mellem planter. Få minutter efter, at lyset er slukket, bliver den aktiv. Den bør ikke håndteres, for huden er følsom, og frøen har intet at vinde ved det.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Vietnam, Laos og Kina.