herpy

FRØER

Chantaburi Bug-eyed Frog

Theloderma stellatum

Theloderma stellatum er en lille, trælevende mosfrø fra lavlandsregnskoven i Thailand, Cambodja, Laos og Vietnam. Den ligner en mørkere udgave af *Theloderma asperum*, bliver omkring 3-4 cm og lægger sine æg over vand i vandfyldte trælommer. Pasningen svarer til slægtsfællernes, men næsten alle tal er lånt fra dem, fordi arten er sjælden i fangenskab.

Familie: Rhacophoridae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**3-4 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende og semi-akvatisk**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift	**Ingen kendt**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H til 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Temperatur, nat	**17-21 °C**
Luftfugtighed	**75-95 %**
Vand	**Vanddel** dybde 5-10 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**På blade over vand**
Kønsmoden	**8-10 mdr.**
Æg pr. lægning	**4-15**
Klækning	**10-14 dage**
Larvetid	**75-180 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står ikke på CITES-listerne, så der kræves ingen CITES-papirer. Køb opdrættede dyr, og bed om dokumentation for oprindelsen.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt dokumenteret viden om pasningen af *Theloderma stellatum*.
TEMPERATUR	Om dagen skal der være 20-24 °C og om natten 17-21 °C. Arten kommer fra lavlandet og er formentlig mindre varmefølsom end de kølige bjergarter i slægten, men temperaturen bør alligevel ikke komme over 25 °C.
LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING	Luftfugtigheden skal ligge på 75-95 % og aldrig under 60 %, ellers kan frøerne tørre ud. Den store vandflade holder fugten oppe af sig selv, så frøerne skal ikke forstøves ret ofte.
VAND OG VANDKVALITET	Frøen opholder sig meget ved vandkanten og sidder endda under vand, så vanddelen er ikke til pynt. Giv et fast vandparti på 5-10 cm dybde med korkplader og korkrør, så både voksne og unger let kan komme op.
LYS OG UVB	Frøen er nataktiv og har ikke dokumenteret brug for UVB. Et svagt UVB-rør til skyggearter (Ferguson-zone 1) kan bruges og er valgfrit, men så skal frøerne altid kunne trække sig i skygge.
FODER	*T. stellatum* æder insekter. Små fårekyllinger er det vigtigste foder, suppleret med voksmøllarver, fluer, springhaler til de mindste unger, små dubia-kakerlakker og soldaterfluelarver.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Theloderma stellatum* er nataktiv og sidder om dagen skjult i rør, mellem planter eller tæt på vandet. Frøen klarer sig i en gruppe, så længe der er plads nok. Hannerne kalder om natten.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Thailand, Cambodja, Laos og Vietnam.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/froer/theloderma-stellatum