herpy

FRØER

Amazon Milk Frog

Trachycephalus resinifictrix

Trachycephalus resinifictrix er en stor, kraftig og nataktiv træfrø fra Amazonas' trækroner. Ungerne er sort- og hvidstribede, de voksne marmorerede, og truet udskiller frøen et mælkehvidt hudsekret. Den yngler i vandfyldte træhuller, er robust i pasning og minder i mangt og meget om *Ranoidea caerulea*.

Familie: Hylidae Tidligere navn: *Phrynohyas resinifictrix* Udgivet 15. november 2026 **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**6-10 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**8-10 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**75 × 30 × 45 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-29 °C**
Temperatur, nat	**18-21 °C**
Luftfugtighed	**50-100 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**I vand**
Kønsmoden	**12-18 mdr.**
Æg pr. lægning	**100-1.500**
Klækning	**1-2 dage**
Larvetid	**21-75 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står ikke på CITES-listerne, så der kræves ingen CITES-papirer. Næsten alle dyr i handlen er opdrættet i fangenskab. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og angives derfor ikke her.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et voksent par kan holdes i et akvarie på omkring 75 liter, og et terrarie på 75 × 30 × 45 cm (længde × bredde × højde) er nok til to til fire voksne, selv om mere plads altid er bedre.
TEMPERATUR	*Trachycephalus resinifictrix* tåler et bredt temperaturspænd.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden er mindre kritisk end temperaturen, men terrariet skal sprøjtes mindst én gang om dagen. Brug afkloret postevand eller osmosevand, der heller ikke giver kalkpletter på glasset.
VAND OG VANDKVALITET	*Trachycephalus resinifictrix* skal have en stor skål med rent vand, der svarer til træhullet i naturen. Skålen skal være så stor, at frøen kan sidde i den, og den bliver brugt næsten hver nat, så spar ikke på størrelsen.
LYS OG UVB	*Trachycephalus resinifictrix* er nataktiv og kan både leve og yngle uden UVB, men unger, der vokser op med UVB, bliver større og får et sundere skelet end unger uden. Derfor anbefales et svagt UVB-lys.
FODER	*T. resinifictrix* er grådig og sjældent kræsen. Fårekyllinger kan udgøre størstedelen af kosten, og de skal være omtrent så lange, som frøens hoved er bredt.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*T. resinifictrix* er ikke et dyr til håndtering. Huden er gennemtrængelig og følsom over for olie og salte fra menneskehud, og hudsekretet kan irritere.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Brasilien, Fransk Guyana, Surinam, Guyana, Venezuela, Colombia, Peru og Ecuador.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/froeer/trachycephalus-resinifictrix