herpy

FRØER

Milk Frog

Trachycephalus typhonius

Trachycephalus typhonius er en stor, nataktiv træfrø med knoldet hud og gyldne øjenkanter. Den lever over et enormt område fra Mellemamerika til det nordlige Argentina, fra regnskov til savanne og haver. Huden udskiller et hvidt sekret, der svider i slimhinder, og pasningserfaringerne er få.

Familie: Hylidae Tidligere navn: *Phrynohyas venulosa* Udgivet 16. november 2026 **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**6-8 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**8-10 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Savanne, tørskov og regnskov**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 40 × 60 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**60-90 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**I vand**
Æg pr. lægning	**100-1.500**
Klækning	**1-2 dage**
Larvetid	**21-75 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står ikke på CITES-listerne, så der kræves ingen CITES-papirer. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og angives derfor ikke her.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Pasningen af *Trachycephalus typhonius* bygger på den nært beslægtede *Trachycephalus resinifictrix*, som er en tilsvarende stor, nataktiv træfrø.

TEMPERATUR
Hold terrariet på 24-28 °C om dagen og 18-22 °C om natten. Beslægtede træfrøer holdes ved 24-29 °C om dagen med en nattesænkning på typisk 3-6 °C. Der er ingen vinterhvile.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING
Luftfugtigheden skal ligge på 60-90 % med en stigning efter sprøjtning.

VAND OG VANDKVALITET
Stil en stor, stabil vandskål i terrariet. Skålen skal være så stor, at frøen kan sidde i den, og vandet skal være lavt, så dyret let kan komme op igen.

LYS OG UVB
Giv 10-12 timers lys om dagen, først og fremmest til planterne. Frøen sover om dagen og er mest aktiv i mørke, så den har ikke brug for kraftigt lys. Et lavt niveau af UVB hjælper frøen med at optage kalken i foderet.

FODER
Frøen tager det meste, den kan overkomme: fårekyllinger, stuefluer, spyfluer, kakerlakker, orme og andre insekter. Fårekyllinger kan udgøre hovedparten af kosten, og de andre foderdyr gives skiftevis.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Trachycephalus typhonius er nataktiv og sover om dagen i skjul, ofte højt oppe, mens den bliver aktiv, når lyset slukkes.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Mexico, Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Trinidad og Tobago, Guyana, Surinam, Fransk Guyana, Brasilien, Bolivia, Paraguay og Argentina.