herpy

FRØER

Fea's Treefrog

Zhangixalus feae

Zhangixalus feae er en af de største flyvefrøer: en kraftig, grøn træfrø på op til 12 cm fra fugtig skov i bjergene i det nordlige Sydøstasien, fra Yunnan og Myanmar over Thailand og Laos til Vietnam. Frøen glider mellem grenene med fuld svømmehud på hænder og fødder og lever skjult i trækronerne. Der findes meget lidt viden om pasningen i fangenskab.

Familie: Rhacophoridae Tidligere navn: *Rhacophorus feae; Polypedates feae*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**7-12 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Hudgift	**Ingen kendt**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**80 × 50 × 100 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Temperatur, nat	**15-20 °C**
Luftfugtighed	**60-90 %**
Vand	**Vandskål** dybde 3-5 cm
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Ægglægning	**I en skumrede**
Æg pr. lægning	**1.000-3.500**
Klækning	**5-7 dage**
Larvetid	**35-45 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står ikke på CITES-listerne, så der kræves ingen CITES-papirer. EU-bilaget er ikke aflæst i tabellen og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Zhangixalus feae*.
TEMPERATUR	Om dagen skal der være 20-24 °C og om natten 15-20 °C, svarende til en køligere stue. Temperaturen må ikke komme over 27 °C i længere tid. Brug ikke varmelamper, og kontrollér med et digitalt termometer, især om sommeren.
LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING	Luftfugtigheden skal ligge på 60-90 %, lavest om dagen og højest om natten. Levende planter holder luften fugtig, fordi de afgiver vand om natten.
VAND OG VANDKVALITET	Stil en stor, lav vandskål i terrariet, som frøen frit kan sidde i. Vandet skal være 3-5 cm dybt, så frøen let kommer op igen. Skift vandet hver dag, og brug afkloreret postevand, regnvand eller osmosevand.
LYS OG UVB	Arten er trælevende og skumringsaktiv, og en svag UVB-kilde anbefales. Et T5-rør med lav UVB-andel, der giver et UV-indeks på 1-3 på de øverste blade (Ferguson-zone 2), er passende.
FODER	*Zhangixalus feae* æder levende insekter. Brug fårekyllinger som hovedfoder, suppleret med græshopper og kakerlakker. Alt foder skal være fodret op og støves med kalk, og en gang imellem med et vitamintilskud med D3.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er nat- og skumringsaktiv og sidder om dagen skjult mellem bladene. Frøen er stor og kraftfuld og springer og glider voldsomt, når den bliver forskrækket, så den bør så vidt muligt ikke håndteres. Huden er tynd og følsom.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Kina, Laos, Myanmar (Burma), Thailand og Vietnam.